


Коллапсом называется **Коллапс**
острая недостаточность в
сосудах.

При коллапсе у больного резко снижается артериальное давление из-за уменьшения тонуса сосудов или по причине резкого уменьшения объема крови. При коллапсе начинается гипоксия всех органов и тканей, снижаются жизненные функции организма, замедляется обмен веществ.

Коллапс



Причины коллапса.

- ◆ 1. В основном коллапс развивается по причине болезни сосудов и сердца, таких как инфаркт или тромбоз артерий.
- ◆
- ◆ 2. При резкой обильной кровопотере или плазмопотере (встречается при ожогах более 70 % поверхности тела).
- ◆
- ◆ 3. При интоксикации организма в случае отравлений или заражении инфекционными заболеваниями.

- ◆ 4. После шока снижается тонус сосудов и провоцирует коллапс.
- ◆
- ◆ 5. В случае заболеваний эндокринной и центральной нервной системы.
- ◆
- ◆ 6. При передозировках различных препаратов.

Симптомы коллапса

- ◆ схожи во всех проявлениях независимо от происхождения, это:
- ◆ - головокружение
- ◆ - общая слабость
- ◆ - помутнение зрения
- ◆ - шум в ушах
- ◆ - чувство страха и беспричинной тоски
- ◆ - резкое побледнение кожи
- ◆ - серость кожи лица
- ◆ - резкое выделение холодного пота
- ◆ - снижение температуры тела
- ◆ - учатившийся пульс
- ◆ - снижение артериального давления до показателей 60 на 40 мм.рт.ст. (если у больного отмечалась гипертония, то при коллапсе показания немного выше данных).

- ◆ Коллапс приводит к олигурии, сгущению крови, азотемии. Далее больной теряет сознание, сердечный ритм нарушается, зрачки расширяются, рефлексy исчезают. При несвоевременном или неэффективном лечении больной умирает.

Как помочь больному?

- ◆ Необходимо положить больного, немного приподнять ему ноги, укрыть теплым одеялом и подкожно ввести 2 мл десятипроцентного раствора кофеин-бензоата натрия. Такого лечения вполне достаточно при ортостатическом коллапсе. Если же артериальное давление не повышается, больного необходимо отправить в стационар, где ему будет проведено более развернутое лечение.

