

Рекомендуемые препараты для лечения гипомании в остром периоде

*(Национальный стандарт Российской Федерации.
Протокол ведения больных
“Маниакальный эпизод”, 2008)*

Препараты первого ряда	Препараты второго ряда
Оланзапин	Соли лития + Клозапин
Рisperидон	Левомепромазин + галоперидол
Соли лития	Рisperидон + Соли Лития
Галоперидол	Сочетание солей Лития и Галоперидола не рекомендуется
Клозапин	

Рекомендуемые препараты для поддерживающей терапии
гипомании

*(Национальный стандарт Российской Федерации.
Протокол ведения больных
“Маниакальный эпизод”, 2008)*

**Препараты первого
ряда**

Соли лития

Рисперидон

**Соли лития Карба-
мазепин**

**Соли лития + Кло-
запин**

симптомов в остром периоде

(Национальный стандарт Российской Федерации.

Протокол ведения больных

“Маниакальный эпизод”, 2008)

Препараты первого ряда	Препараты второго ряда
Соли лития + Клозапин+ Карбамазепин	Соли лития+ Левомепромазин+ Карбамазепин
Соли лития+ Рисперидон+ Карбамазепин	Соли лития+ Хлорпромазин+ Карбамазепин
	Сочетание солей Лития и Га- лоперидола не рекомендует- ся

психотических симптомов

(Национальный стандарт Российской Федерации.

Протокол ведения больных

“Маниакальный эпизод”, 2008)

Трепараты первого ряда

Соли лития+ Клозапин

Соли лития+ Рисперидон

Соли лития Карбамазепин

Галоперидол деканоат

симптомами в остром периоде

(Национальный стандарт Российской Федерации.

Протокол ведения больных

“Маниакальный эпизод”, 2008)

Трепараты первого ряда	Трепараты второго ряда
Соли лития + Клозапин	Соли лития + Хлорпромазин+ Трифлуоперазин
Соли лития + Рисперидон	Соли Лития + Трифлуоперазин+ Левомепромазин
Соли лития+ Оланзапин	Рисперидон + Соли Лития
	Сочетание солей Лития и Галопе- ридола не реко- мендуется

Рекомендуемые препараты для поддерживающей терапии мании с психотическими симптомами

*(Национальный стандарт Российской Федерации.
Протокол ведения больных
“Маниакальный эпизод”, 2008)*

Препараты первого ряда

Соли лития+
Клозапин

Соли лития+
Рисперидон

Соли лития+
Трифлуоперазин Карбамазепин
Галоперидол деканоат

Лечение мании при БАР

(G.S. Malhi, D.Adams, C.M.Cahill. The management of individuals with Bipolar Disorder / Drugs, 2009, № 15, 69, 2063-2101.)

Препараты первого ряда	Препараты второго ряда
Литий, Вальпроат Na	Галоперидол, Карбамазепин
Атипичные антипсихотики	
Литий, Вальпроат Na + Атипичные антипсихотики	

Лечение депрессии при БАР

(G.S. Malhi, D.Adams, C.M.Cahill. The management of individuals with Bipolar Disorder / Drugs, 2009, № 15, 69, 2063-2101.)

Препараты первого ряда	Препараты второго ряда
Литий	Ламотриджин, Карбамазепин
Вальпроат Na	Оланзапин, Арипипразол
Кветиапин	Оланзапин+Флуоксетин (Symbyax)

Лечение смешанных состояний

(G.S. Malhi, D.Adams, C.M.Cahill. The management of individuals with Bipolar Disorder / Drugs, 2009, № 15, 69, 2063-2101.)

Вальпроат Na, Оланзапин

Карбамазепин

Вальпроат Na + Оланзапин

Терапию антидепрессантами прекращают

Назначение антидепрессантов не рекомендуется

Профилактическая терапия при БАР

(G.S. Malhi, D.Adams, C.M.Cahill. The management of individuals with Bipolar Disorder / Drugs, 2009, № 15, 69, 2063-2101.)

Литий (преобладание МФ)

Ламотриджин (преобладание ДФ)

Арипипразол (равноэффективен МФ, ДФ)

Кветиапин (преобладание МФ)

Оланзапин (преобладание МФ)

У атипичных антипсихотиков (арипипразол, кветиапин, оланзапин) нет достоверной эффективности => их нельзя рассматривать в качестве классических тимостабилизаторов

Аффективные расстройства, индуцированные приемом лекарственных препаратов

Мания	Депрессия
Трициклики (инверсия аффекта)	Типичные нейролептики
Венлафаксин (инверсия аффекта)	Наркотические анальгетики
Ингибиторы МАО	Гипотензивные средства (β -адреноблокаторы, клонидин)
Амфетамины	Амфетамины (после прекращения приема)
Кортикостероиды	Кортикостероиды
Анаболические стероиды	Противоопухолевые средства (винбластин, винкристин)
Бензодиазепины	Бензодиазепины
Леводопа	Леводопа
Ипрониазид	Гиполипидемические средства
Баклофен	НПВС (ибупрофен, индометацин)
Тироксин	