

# Язва желудка

Выполнил: Аймаганбетов Е.  
Проверил: Атантаев А.Б.  
Группа : 705-1

- хроническое заболевание, с чередованиями периодов обострения и затишья, с вовлечением в процесс наряду с желудком и двенадцатиперстной кишкой (в которых в периоды обострения образуются язвенные дефекты слизистой оболочки) других органов системы пищеварения. Язвенная болезнь возникает вследствие нарушений защитных механизмов слизистой оболочки этих органов.

## **Язвенная болезнь**

- Язвенная болезнь встречается у людей любого возраста.
- Основной причиной развития язвенной болезни является нарушение баланса между факторами защиты (слизь желудка, сок поджелудочной железы и др.) и факторами агрессии (соляная кислота, ферменты).
- При язве желудка возникают также «голодные», ночные, поздние (через 2-3 часа после еды) боли, напоминающие боли при язве двенадцатиперстной кишки. При язвах боли могут быть интенсивные, не связанные с приемом пищи.

## Основные причины

- К развитию язвы желудка приводит нарушение естественного баланса между защитными функциями желудка (выработка слизи, нормальное кровоснабжение и иммунная защита) и действием агрессивных факторов, таких как:
  - ▢ Заражение микроорганизмами
  - ▢ Нерациональное питание (переедание, недоедание, острая еда, нарушение графика приема пищи).
  - ▢ Злоупотребление алкоголем и табакокурением, кофе и другими кофеин-содержащими напитками.
  - ▢ Хронические заболевания органов пищеварения (гастрит, колит, панкреатит, цистит и др.).
  - ▢ Постоянные стрессовые ситуации, приводящие к спазмам мышц и кровеносных сосудов желудочно-кишечного тракта (так называемая «стрессовая язва»).
  - ▢ Повышенное содержание соляной кислоты в желудке.
  - ▢ Закупорка кровеносных сосудов желудка тромбами.
  - ▢ Травмы позвоночника и пр.

## Язвенная болезнь желудка

- ❖ Желудочное кровотечение, симптомами которого являются рвота ярко-красной кровью, появление красно-коричневой переваренной крови в кале, слабость и обморочное состояние.
- ❖ Пенетрация — разрушение мышечной стенки желудка и проникновение язвы в близлежащие органы (печень, поджелудочную железу и др.), которое характеризуется регулярной болью режущего характера.
- ❖ Прободение язвы (перфорация) — сквозное повреждение стенки желудка, при котором наблюдается повышение температуры тела и резкая интенсивная боль в животе. Часто развивается после употребления алкоголя, переедания, чрезмерного физического напряжения, травмы. Прободение язвы в брюшную полость без оказания оперативной помощи заканчивается в течение 3-4 суток с момента ее появления смертью по причине гнойного перитонита.
- ❖ Сужение выходного отверстия желудка (стеноз) является следствием воспаления тканей вокруг язвы, которое проявляется постоянной рвотой, вздутием живота, отсутствием аппетита.
- ❖ Раковое перерождение язвы.

**Болезнь может давать серьезные осложнения:**