



# **ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНИКТОМИИ**



# КОНИКТОМИЯ

- Применяется у взрослых и **детей старше 8 лет**. У детей до 8 лет проводится **пункционная коникотомия**.
  - **Коникотомия** (рассечение конической связки) является более безопасным методом по сравнению с трахеотомией, так как:
    - в этом месте трахея расположена наиболее близко к кожному покрову;
    - нет крупных сосудов и нервов;
    - манипуляция относительно проста в исполнении.



# Подготовьте для коникотомии

- ❖ Перчатки стерильные .
- ❖ Раствор йода или спирт.
- ❖ Режущий предмет, скальпель, нож.
- ❖ Полу трубку, плоский тупой предмет.
  - ❖ Бинт или пластырь.



## ***Порядок выполнения коникотомии***

- Наденьте перчатки, обработать руки 96% спиртом.
- Нащупайте щитовидный хрящ (адамово яблоко, или кадык) и соскользните пальцем вниз вдоль срединной линии. Следующий выступ - перстневидный хрящ, имеющий форму обручального кольца. Углубление между этими хрящами и будет являться конической связкой.
- Обработайте шею йодом или спиртом.



- Зафиксируйте щитовидный хрящ пальцами левой руки (для левшей - наоборот).
- Пальцами правой руки захватите режущий инструмент на два сантиметра от острия для предотвращения перфорации задней стенки трахеи.
- Правой рукой сделайте продольный разрез, рассекая кожу, не вынимая скальпель поперечно разрежьте коническую связку.
- Вставьте коникотомическую трубку.
- Проверьте правильность нахождения трубки в трахеи, появятся дыхательные шумы, экскурсия грудной клетки, дыхание над легкими прослушивается.



**Внимание:** При отсутствии самостоятельного дыхания проводить искусственное дыхание в трубку или отверстие



## **ПУНКЦИОННАЯ КОНИКОТОМИЯ (С ПОМОЩЬЮ ИГЛЫ)**

- **Выполняется у детей до 8 лет. До 8 лет велика опасность повреждения хрящей гортани. Поврежденные хрящи отстают в развитии, это приводит к сужению дыхательных путей. При использовании иглы нарушается целостность только конической связки.**





## ***Подготовьте для пункционной коникотомии***

- ❖ Перчатки стерильные.
- ❖ Раствор йода или спирт.
- ❖ Широкую полую иглу (лучше с катетером).
- ❖ Бинт или пластырь.





## **Порядок выполнения пункционной коникотомии**

- Наденьте перчатки.
- Нащупайте щитовидный хрящ (адамово яблоко, или кадык) и соскользните пальцем вниз вдоль срединной линии. Следующий выступ - перстневидный хрящ, имеющий форму обручального кольца. Углубление между этими хрящами и будет являться конической связкой.
- Обрабатывайте шею йодом или спиртом.



- Зафиксируйте щитовидный хрящ пальцами левой руки (для левшей - наоборот).
- Правой рукой введите иглу через кожу и коническую связку в просвет трахеи.
- Зафиксируйте ее пластырем или бинтом. Если используется игла с катетером, выньте иглу.
- Для увеличения дыхательного потока можно последовательно вставить несколько игл.