

**Бобры.**





# Давайте знакомиться!





**Обыкновенный бобр,**  
**или речной бобр**—  
полуводное  
млекопитающие отряда  
грызунов;



**Бобр** — крупный грызун,  
приспособленный к  
полуводному образу жизни.  
Длина его тела достигает  
1-1,3 м, высота в плече —  
до 35,5 см, а масса — до  
30-32 кг.





Когти на лапах сильные, уплощённые. Хвост веслообразный, сильно уплощённый сверху вниз; его длина — до 30 см. Глаза у бобра небольшие; уши широкие и короткие, едва выступающие над уровнем меха.



# Нора:



Живут бобры в норах или хатках. Вход в жилище бобра всегда располагается под водой. Норы бобры роют в крутых берегах; они представляют собой сложный лабиринт с 4-5 входами. Стены и потолок норы старательно разравниваются и утрамбовываются.



# Хатка:



Хатки строятся в местах, где рытьё норы невозможно, — на низких заболоченных берегах и на отмелях. Постройку нового жилья бобры редко начинают раньше конца августа. Хатки имеют вид конусообразной кучи хвороста, скреплённого илом и землёй, высотой до 1-3 м и диаметром до 10-12 м. Стены хатки тщательно обмазывают илом и глиной, так что она превращается в настоящую крепость, неприступную для хищников; воздух поступает через потолок.







# ПЛОТИНЫ:








**Бобровая плотина на реке Страдинке  
(Ивановская область, Ивановский район)**









**Бобровый пруд. Схема**

1 — плотина, 2 — пруд, 3 — запасы пищи, 4 — хатка, 5 — входы в хатку, 6 — вентиляционное отверстие



# Питание:



Бобры строго растительноядны. Питаются они корой и побегами деревьев, предпочитая осину, иву, тополь и берёзу, а также различными травянистыми растениями. Крупные зубы и мощный прикус позволяют бобрам легко справляться с твёрдыми растительными кормами.



# Бобры - заботливые родители



Потомство приносят 1 раз в год. Детёныши (1-6 в выводке) рождаются в апреле — мае.



# Детёныши бобров:



Они полузрячие, хорошо опушённые, весят в среднем 450гр. Через 1-2 суток они уже могут плавать; мать обучает бобрят, буквально выталкивая их в подводный коридор. В возрасте 3-4 недель бобрята переходят на питание листьями и мягкими стеблями трав, но мать продолжает подкармливать их молоком до 3 месяцев. Подросший молодняк обычно еще 2 года не покидает родителей. Лишь в 2 года молодые бобры отселяются.