

# Ленивцы



©Ижбулдиной Виктории ♡

7б класс\_МБОУ школа №88

# Ленивцы-характерные черты

- Размеры ленивцев не большие: длина тела этого зверя обычно составляет 50-60 см, вес 4-6 кг. Тело ленивца покрыто шерстью, которая имеет коричнево-серый окрас.
- Голова ленивца маленькая и также покрыта шерстью, порой настолько сильно, что видны лишь глаза животного. В целом мордочка ленивца чем-то напоминает то ли Чубаку из «Звездных войн», то ли просто необычную лохматую [обезьяну](#). Интересный факт: зубы ленивца лишены эмали, тем не менее, они все равны как на подбор.
- [Как выглядит ленивец](#)



# Виды (источник)



Бурогорлый ленивец (*Bradypus variegatus*) травоядный подви вид семейства трёхпалых проживающий по всей территории лесов Южной Америки. Представители вида столь многочисленные что легко составляют конкуренцию обыкновенному трёхпалому ленивцу.



Трёхпалый ленивец (*Bradypus tridactylus*) или ленивец обыкновенный. Это самый многочисленный и распространённый вид представителей рода.



Двупалый ленивец (*Choloepus didactylus*) или унау из семейства двупалых. Вид населяет тёплые тропические леса Амазонки, Бразилии и Перу. Довольно крупный представитель семейства, вес взрослых особей может достигать 5.7–9.9 кг. Длина тела от 54 до 75 см. Тело покрыто серо-коричневой или бежевой



Ленивец Гоффмана (*Choloepus hoffmanni*) млекопитающие из семейства двупалых ленивцев. Вид широко распространён по территории Перу, Гондураса, Бразилии и Никарагуа. Половозрелые особи могут вырастать до 53–78 см, вес тела животного от 5,3 до 7,1 кг.

## Питание

**В основном ленивцы питаются древесными листьями, хотя могут при случае съесть насекомое или мелкую ящерицу.** Листья трудно перевариваются и обладают очень низкой калорийностью и питательной ценностью. Для переваривания растительной клетчатки ленивцы используют бактерий-симбионтов, входящих в состав микрофлоры их пищеварительного тракта. Съеденные листья перевариваются в желудке млекопитающего около 90 часов.