

*Дифференциальная
диагностика*

ОРВИ

<u>Признаки</u>	<u>Грипп</u>	<u>Парагрипп</u>	<u>РС-инфекция</u>	<u>АВИ</u>	<u>Риновирусная инфекция</u>
<u>Инкуб. период</u>	При гриппе А- до 2 сут., Грипп В- до 3-4 сут.	2 - 7 дней, чаще 3—4 дня	3 - 7 дней	2 - 12 дней	2 - 3 дня
<u>Начало заболевания</u>	Острое, максимум уже на 2-й день	Постепенное, максимальная температура чаще на 3-й день	Постепенное	Острое, постепенное появление симптомов.	Острое
<u>Ведущий клинический</u>	<ul style="list-style-type: none"> Выраженная интоксикация, 	<ul style="list-style-type: none"> Катар, синдром крупа (ларингит) быстро 	<ul style="list-style-type: none"> Катаральный, дыхательная недостаточность, обструкти 	<ul style="list-style-type: none"> Катар, поражение лимфоидной ткани ротоглотки 	<ul style="list-style-type: none"> Катар, обильные слизистые

<u>Признаки</u>	<u>Грипп</u>	<u>Парагрипп</u> <u>п.</u>	<u>РС-</u> <u>инфекция</u>	<u>АВИ</u>	<u>Рино-</u> <u>вирусная</u> <u>инфекция</u>
<u>Выраженность</u> <u>интоксикации</u>	Сильная	Слабая или умеренная	Умеренная или слабая	Умеренная	Слабая
<u>Длительность</u> <u>интоксикации,</u> <u>болезни</u>	2-5 дней	1-3 дня, до 7-10 дней	3-8 дней, до 2-3 нед.	8-10 дней	1-2 дня
<u>Температура</u> 	39°С и выше, но может быть и субфебри	37—38 °С, может длительно	Субфебрильная, иногда нормаль	38-39°С, реже 40° С 2—3 дню	Нормальная или субфебриль

<u>Признаки</u>	<u>Грипп</u>	<u>Парагрипп</u>	<u>РС-инфекция</u>	<u>АВИ</u>	<u>Рино-вирусная инфекция</u>
<u>Катаральные явления</u>	Умеренные, присоединяются позднее	С 1-го дня, осиплость голоса	Выражены, постепенное нарастание	Сильно с 1-го дня	С 1-го дня болезни
<u>Ринит</u>	Серозные, слизистые или сукровичные выделения до 50%	Затруднение носового дыхания, заложенность носа.	Заложенность носа, необильное серозное отделяемое	Обильное слизисто-серозное отделяемое; резко затруднено носовое дыхание	Обильное серозное отделяемое; носовое дыхание затруднено или отсутствует

<u>Признаки</u>	<u>Грипп</u>	<u>Парагрипп</u>	<u>РС-инфекция</u>	<u>АВИ</u>	<u>Риновирусная инфекция</u>
<u>Кашель</u> 	Сухой, мучительный, надсадный, с болями за грудиной до 7—10 дня болезни; на 3-й сутки влажный	Сухой, «лающий», может сохраняться длительное время (иногда до 12—21 дня болезни)	Сухой, приступообразный продолжительный до 3 нед., может сопровождаться болями за грудиной	Влажный	Сухой, першение в глотке
<u>Изменения слизистых оболочек глотки</u>	Слизистые глотки и миндалин синюшны, умеренно гиперемированы, инъекция	Гиперемия зева, мягкого неба, задней стенки глотки, фаринготонзиллит	Слабая гиперемия слизистых оболочек	Умеренная гиперемия, отечность, гиперплазия фолликул миндалин	Слабая гиперемия

<u>Признаки</u>	<u>Грипп</u>	<u>Парагрипп</u>	<u>РС-инфекция</u>	<u>АВИ</u>	<u>Риновирусная инфекция</u>
<u>Ведущий синдром респираторных поражений</u>	Трахеит, сегментарный отек легких	Ларингит	Бронхит, бронхиолит ; возможен бронхоспазм	Ринофарингит, конъюнктивит и/или тонзиллит, с 1-го дня серозные выделения из носа	Ринит
<u>Увеличение лимфатических узлов</u>	Отсутствует	Углочелюстные, заднешейные, реже подмышечные увеличены и умеренно	Отсутствует	Может быть полиаденит	Отсутствует

<u>Признаки</u>	<u>Грипп</u>	<u>Парагрипп</u>	<u>РС-инфекция</u>	<u>АВИ</u>	<u>Рино-вирусная инфекция</u>
<u>Увеличение печени и селезенки</u>	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отмечается	Отсутствует
<u>Поражение глаз</u>	Инъеция сосудов склер	Отсутствует	Отсутствует	Конъюнктивит, кератоконъюнктивит	Инъеция сосудов конъюнктив склер, век; слезотечение

<u>Признаки</u>	<u>Грипп</u>	<u>Парагрипп</u>	<u>РС-инфекция</u>	<u>АВИ</u>	<u>Риновирусная инфекция</u>
<u>Течение</u>	Острое	Подострое	Подострое, иногда затяжное	Затяжное, волнообразное	Острое
<u>Кровь</u>	1-й день нейтр. лейкоцитоз, влево, 2-й день лейкопения, лимфоцитоз	Вначале умеренный лейкоцитоз, позже лейкопения и небольшой лимфоцитоз	Умеренный лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг влево, до 5% эозинофилов	1-е дни небольшой лейкоцитоз с нейтрофилозом, лимфоцитоз	-

<u>Признаки</u>	<u>Грипп</u>	<u>Парагрипп</u>	<u>РС-инфекция</u>	<u>АВИ</u>	<u>Риновирусная инфекция</u>
<u>Осложнения</u>	<p>Бакт. флора: отиты, синуситы, гнойный ларинготрахеобронхит, очаговая или сегмент пневмония; менингит, энцефалит, подпирадик</p>	<p>Пневмония, ангина, синуситы, отит (присоед. бакт. инф.); синдром крупа</p>	<p>Отит, синусит, пневмония, круп, исход в БА?</p>	<p>Вторичная бакт. инф.; средний отит, синуситы, очаговые полисегментарные пневмон</p>	<p>Отиты, трахеобронхит, пневмония, синуситы</p>

Опорные клинические симптомы



Грипп

- острое, бурное начало заболевания;
- повышение температуры тела с ознобом в первые сутки до максимальных цифр (39-40°C), лихорадка сохраняется в течение 3 – 4 дней;
- бурно нарастающие в первые часы заболевания симптомы интоксикации, сохраняющиеся в течение 2 -4 дней;
- развитие катарального синдрома через сутки, обязательное вовлечение в процесс трахеи.

Парагрипп

- Острое начало заболевания
- Повышение температуры тела до субфебрильных или фебрильных цифр в течение 3-5 дней
- Явления интоксикации выражены умеренно или слабо
- Выраженный катаральный синдром с первого дня болезни с преимущественным поражением гортани.

Опорные клинические симптомы



РС-инфекция

- Острое начало заболевания
- Повышение температуры тела до субфебрильных и фебрильных цифр в течение 3-7 дней
- Слабо или умеренно выраженная интоксикация
- Катаральный синдром в виде поражения бронхов среднего и мелкого калибра с развитием бронхообструкции.



АВИ

- Возможно как острое, так и постепенное начало заболевания с нарастанием выраженности клинических симптомов и вовлечением в процесс все новых органов.
- Интоксикация слабо или умеренно выражена.
- Длительное повышение температуры тела до фебрильных цифр.
- Выраженный и длительно сохраняющийся катаральный синдром.
- Возможно увеличение лимфоузлов всех групп.
- Возможна гепатоспленомегалия.
- Поражения глаз (конъюнктивит, кератоконъюнктивит).

***Спасибо за
внимание!!!***