

«Обитатели
Бузулукского бора».

ЛОСЬ

И один из ярких представителей бора— это Лось. Крупное красивое животное из семейства оленьих, является главной фигурой на гербе «Бузулукский бор». Легко преодолевать глубокие снежные сугробы, болота. Хорошо плавают. Основной пищей служат побеги и кора древесных пород и кустарников, трава иван-чай, калужница, различные осоки.



КАБАН

парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свинных. Является предком домашней свиньи.



Лиса обыкновенная

Относится к типичным хищникам, питается очень разнообразными кормами. Среди употребляемой пищи выявлено более 400 видов животных и нескольких десятков видов растений. Повсеместно основу питания составляют мелкие грызуны, главным образом полёвковые. Так же глухари, гуси, и даже кладки яиц. Во время мора может поедать умерших животных.



СИБИРСКАЯ КОСУЛЯ

Питание разнообразно: весной – первоцветы, летом – листья излюбленных растений, осенью – некоторые виды грибов, ягоды, листья брусники, черники и др. Звери, живущие в лесу, чаще используют в пищу побеги лиственных древесных и кустарниковых пород, верхушечные части побегов и хвою сосны, пихты, ели.



БАРСУК

Обитает барсук в глубоких норах, которые роет по склонам песчаных холмов, лесных оврагов и балок. Барсук всеяден, но предпочитает животную пищу. Питается он мышевидными грызунами, лягушками, ящерицами, птицами и их яйцами (а также черепашьими яйцами), насекомыми и их личинками, моллюсками, дождевыми червями, а также грибами, ягодами, орехами и травой.



Северная выдра

Один из крупных представителей куньих. Длина тела 70-75 см. Хвост более 50 см, длинный и мускулистый. Тело обтекаемой формы, ноги короткие, пальцы соединены плавательной перепонкой до когтей. Голова небольшая, уплощенная. мех с густой и нежной подпушью. Обитатель пресных водоемов. Питается рыбой, водными животными. Активна в сумерках и ночью. Имеет постоянную нору. Ведет одиночный образ жизни.



Среднерусская норка

Размеры средние. Тело стройное, хвост короче тела, не пушистый. Конечности короткие, между пальцами хорошо развита плавательная перепонка. меховой покров короткий, шелковистый, густой.

Уши небольшие, закругленные, на губах и подбородке белые пятна.



Байбак европейский

Питается сочными и мягкими растительными кормами. Их излюбленными растениями являются дикий овёс, пырей, цикорий, клевер. За день байбак съедает до 1—1,5 кг растительной массы. Воды обычно не пьёт, довольствуясь влагой, содержащейся в растениях, или утренней росой. Потребляет и животные корма — саранчовых, гусениц, травой.



Белка

башкирская

Убежища устраивает в дуплах деревьев или строит гнездо — «гайно». Питается семенами, плодами, почками деревьев, а также насекомыми. На зиму делает кормовые запасы.



Выхухоль русская

Приспособлена к полуводному образу жизни. Населяет пойменные водоемы с постоянным уровнем воды. Норы устраивает в высоких, некрутых берегах, под корнями деревьев и кустарников. Питается мелкими животными и растениями. Активна в сумерках и ночью.



Гигантская вечерница

Является самой
крупной летучей
мышью в Европе
и России.

Охотится по
лесным опушкам
и поверхностям водоемов.

Живет в дуплах деревьев в колониях других
летучих мышей.



Тетерев

Большую часть жизни тетерев проводит на земле, хотя зимой почти повсеместно кормится на деревьях.



Глухарь

Названием «глухарь» птица обязана известной особенности токующего в брачный период самца утрачивать чуткость и бдительность, чем часто пользуются охотники.



Орел-могильник

Крепкое туловище, когтистые лапы темно-синего цвета, мощный клюв выдают в ней родство с беркутом. Рацион могильника составляют суслики, полевые мыши, зайцы, сурки, хомяки. И лишь, когда мелкие грызуны впадают в спячку эти птицы могут употреблять падаль.



Мухолловка-пеструшка

Охотятся, поджидая насекомых в видном месте. Могут ловить дневных бабочек с их сложным зигзагообразным полетом, «зависать» в воздухе и собирать насекомых со стен и коры. Они хватают насекомых так, что отламывают крылья и лапки.

Оставшиеся твердые части проглатывают.



Сизевородка

Питается в основном крупными насекомыми, но также пауками, моллюсками, червями, мелкими позвоночными животными, фруктами и ягодами. Охотится в местах с открытым грунтом или низкой редкой растительностью, добычу ловит или собирает в основном на земле, высматривая её с присады.



Седой дятел

Основу его рациона составляют муравьи (преимущественно мирмики, формики и лазиусы), а также имаго и личинки термитов. Кроме того, седой дятел питается другими насекомыми (например, личинками жуков, гусеницами, сверчками) и пауками. Осенью и зимой употребляет в пищу растительные корма — плоды таких деревьев яблоня, груша, вишня, семена сумаха, ягоды, орехи, жёлуди.

В холодное время года нередко посещает кормушки.



Черная гадюка

Взрослые гадюки питаются обычно мелкими грызунами, землеройками, наземно гнездящимися птицами и лягушками.

Пищевой рацион молодых гадюк включает преимущественно сеголеток,

бурых лягушек и мелких ящериц. Отмечено также поедание чесночниц, единичные случаи поедания рыбы и падали.



Серая цапля

Это исключительно животная птица, активный и очень прожорливый хищник. Основу её рациона составляет рыба и различные водные позвоночные, насекомые, моллюски, ракообразные и др., однако цапли в больших количествах поедают и сухопутных животных — мелких грызунов, ящериц, змей, жуков, саранчу.



Лягушка травяная

Зимует обычно в воде – в реках, канавах, ключах, ручьях и озерах, в основном там, где есть течение. В водных зимовках обычно встречаются группами. Нередки массовые заморы особей от недостатка кислорода в воде. Некоторые лягушки зимуют на суше в норах или трухлявых деревьях, ямах. Но эти группы часто подвергаются массовой гибели от морозов, особенно в бесснежные зимы.



Тритон гребенчатый

Тритоны живут в пресноводных водоемах. Тритон регулярно линяет. Иногда его старую кожу можно увидеть на водных растениях. Живет до 27 лет. Гребенчатые тритоны способны издавать звуки – скрип, писк и глухой свист.



Быстрянка русская

Держится на участках рек с быстрым течением. В некоторых водоемах весьма многочисленна, однако хозяйственного значения не имеет. Русская быстрянка намечена к занесению в Красную книгу России.



Бронзовка гладкая

Личинки
развиваются в
трухлявых пнях
старых деревьев.
Находится на
грани
исчезновения и
занесена в
Красную книгу
России.



Шмель степной

Численность очень низкая. Вид практически исчез или встречается очень редко. В последние десятилетия численность резко сократилась в результате сплошной распашки целинных степей и применения пестицидов.



© A.V. Antropov

Красотел бронзовый

Является активным хищником, уничтожает гусениц. Добычу ловит как на поверхности почвы, так и на стволах деревьев и кустарников. Очень подвижными хищниками являются и личинки красотела, обитающие в подстилке и верхних слоях почвы.



Усач кожевенник

Повсеместно
редкий
малоизученный
вид, фактическая
численность
неизвестна. Внесен
в Красную книгу
Оренбургской
области.



Шмель плодовый

Собирать нектар и получать мед могут не только пчелы, но и шмели, именно им они кормят свое потомство, однако медовых запасов на зиму шмели не делают.



Желтушка шафранная

Обитатель
открытых
пространств с
присутствием
цветоносов.
Желтая форма
встречается
крайне редко.



Траурница

Раньше была широко распространена по всей Европе, позже численность резко уменьшилась по неизвестным причинам. Сейчас сохраняется на низком, но постоянном уровне.

