


# ВЕРРУКОЗНАЯ ЛЕЙКОПЛАКИЯ

**Код (коды) по МКБ-10:**

К 13.2 Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта.

Подготовила студентка V курса  
21 группы Рыжкова Д.Н.

# ФАКТОРЫ РИСКА



THE HUMAN PAPILOMA VIRUS




# КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕЙКОПЛАКИИ

## **Клиническая классификация:**

1. Плоская (простая).
2. Веррукозная  
(бляшечная, бородавчатая).
3. Эрозивная.
4. Лейкоплакия  
курильщиков Таппейнера.
5. Мягкая.



# БЛЯШЕЧНАЯ ФОРМА



- Основной морфологический элемент бляшка, перламутрово-белого или мелоподобного цвета с четкими зазубренными или размытыми границами.
- Элемент незначительно возвышается над уровнем СОР



# БОРОДАВЧАТАЯ ФОРМА



- Очаг поражения в виде плотных бугристых образований или бородавчатых разрастаний типа бородавки, с широким основанием, безболезненных, не спаянных с подлежащей слизистой оболочкой
- Элемент резко возвышается над уровнем нормальной СОР



# ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ

1. Сбор жалоб и анамнеза
2. Визуальный осмотр слизистой полости рта
3. Исследование гистологического/цитологического материала методом электронной микроскопии

# ЛЕЧЕНИЕ

- устранение этиологических факторов болезней СОР
- Эпителизирующие средства: Токоферола ацетат, 30%, для аппликаций на элементы поражения в полости рта (уровень доказательности D).
- Антисептики: Хлоргексидина биглюконат, 0,05% для обработки слизистой полости рта.
- Обезболивающие препараты (по показаниям): Лидокаина гидрохлорида, 1%, для аппликаций слизистой полости рта с целью обезболивания.
- При непереносимости амидных анестетиков (лидокаин): Прокаин, 5мг/мл, 0,5%, для аппликаций на слизистую полости рта, с целью обезболивания перед приемом пищи и обработкой элементов поражения до стихания болевых ощущений
- Диатермокоагуляция/криодеструкция
- Хирургическое лечение