

**ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ «ПРИЗВАНИЕ»**

**«РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В
ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФЕКЦИЙ,
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ»**

Выполнила:

студентка группы Л 401-11

Гайдавова Милана Марсельевна


Научный руководитель:

Нахушева Залина Хамидбиевна

Нальчик, 2022


Актуальность темы:

- Инфекции передаваемые преимущественно половым путем (ИППП), представляют собой одну из наиболее значимых проблем современной медицины
- Это обусловлено:
 - высокой распространенностью
 - вероятным возникновением врожденных заболеваний у детей
 - значительной тяжестью ИППП, в ряде случаев приводящих к инвалидизации



Задачи исследования:


- Определить понятие, этиологию и особенности клинической картины ИППП
- Провести классификацию и рассмотреть методы диагностики ИППП
- Исследовать деятельность фельдшера в профилактике инфекций, передающихся половым путем



Инфекции, передаваемые половым путем


Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), - это группа инфекционных заболеваний, возбудители которых передаются преимущественно половым путем.


К инфекциям, передающимся половым путем, относятся 22 заболевания. Их условно разделяют на две группы: классические венерические болезни; другие инфекции, передающиеся половым путем.



Классификация ИППП

- Венерические заболевания, или классические – **сифилис, гонорея**
- «Новые» венерические болезни (инфекции мочеполовых органов с преимущественным поражением половых органов) – **генитальный герпес, трихомоноз, хламидиоз, уреаплазмоз**







ВИЧ




гонорея




вирус папилломы человека (ВПЧ)



сифилис



хламидиоз



генитальный герпес

Что повышает риск заражения ИППП?

1

Раннее начало половой жизни

2

«Незащищённые» половые контакты

3

Частая смена половых партнёров

4

Употребление алкоголя и наркотиков

5

Наличие сопутствующих ИППП

6

Иммунодефицитные состояния



Пути распространения инфекции


- **Восходящий** – при сексуальных контактах, через цервикальный канал, полость матки, маточные трубы – на органы брюшной полости
- **Лимфогенный**
- **Гематогенный**
- **Контактный** – по брюшине из первичного патологического очага, например, при аппендиците
- **Трансплацентарный** – при беременности



C. trachomatis
30%



T. vaginalis
частота варьирует



N. gonorrhoeae
40 – 50%




M. genitalium



U. urealyticum
12 – 20%



Полимикробная
флора 60%



E. coli
27-30%





Streptococcus spp.
20-30%




Staphylococcus spp.
10-12%

Хламидиоз

Хламидиоз самое распространенное ЗППП. Возбудитель хламидиоза *Chlamidia trachomatis* занимают промежуточное положение между вирусами и бактериями, по этой причине заболевание очень трудно диагностировать и тяжело лечить.




Гонорея




Это инфекционное венерическое заболевание, поражающее слизистые оболочки мочеполовых органов, слизистой глаз, полости рта и прямой кишки. Заражение возможно при любых половых контактах. Можно заразиться через полотенце. Лечится относительно легко, но у врача. Мужчинам иногда помогает помочиться, сразу после полового акта. Профилактика: презерватив, здоровый партнер, верность.

Урогенитальный трихомоноз




Генитальный герпес



СПИД. ВИЧ.





**Вирус
иммунодефицита
человека**



**Смертельно опасный
вирус СПИДа**

Многие путают два совершенно различных понятия - ВИЧ-инфицированный и больной СПИДом. Разница заключается в том, что человек, инфицированный вирусом иммунодефицита, может в течение многих лет оставаться работоспособным, относительно здоровым человеком. Такой человек не представляет никакой опасности для окружающих.



**Трехмерное
изображение
вируса СПИДа**

СИМПТОМЫ

ОСЛОЖНЕНИЯ



Очень часто ИППП протекают
скрыто и могут быть обнаружены
только с помощью специального
обследования!


Если у одного из партнеров
выявлены ИППП, лечиться
необходимо **ОБОИМ**
партнерам!

Самопроизвольного
выздоровления от ИППП
не бывает. Установить
диагноз и правильно
назначить лечение может
только врач!



Мадам, вы, конечно, не Венера,
но что-то венерическое
в вас есть!

ГИНЕКО



При несвоевременном лечении:

- заболевание может стать **хроническим**, т.е. меньше проявляться и **труднее лечиться**.
- воспаление может распространяться по мочевым путям в почки, через кровь и лимфу инфекция может попасть в другие органы системы.




бесплодие, импотенция




Диагностика

- выяснение жалоб,
- гинекологический (урологический) осмотр,
- специальные методы обследования (кольпоскопия, взятие отделяемого с половых органов для исследования и др.),
- бактериоскопическое и бактериологическое исследование («золотой стандарт» - выделение чистой культуры возбудителя),
- иммунологические методы исследования (ИФА, РИФ),
- ДНК-диагностика (ПЦР).

Для каждого заболевания, передающегося половым путем, существует свой набор инструментальных и лабораторных исследований



Лечение



Профилактика




ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ




ГБУЗ
«ЦРБ» г.
Баксан



Заболееваемость ИППП за 2019-2021гг.




Распространённость




Социально-эпидемиологическая характеристика больных ИППП



Знаете ли вы, что такое венерические заболевания?




Пути распространения ИППП




Источник информации

50%




СМИ

10%




Печатная
продукция

19%



16%



**Важно правильно
использовать
презерватив!!!!**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

