

# Синдром острого живота

- **Острый живот (ОЖ)** - это клинический симптомокомплекс, развивающийся при повреждениях и острых заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства, угрожающий жизни и требующий неотложной помощи.
- Термин ОЖ является собирательным понятием, объединяющим группу заболеваний, различных по этиологическому признаку и патогенезу

# Основные причины ОЖ

1. Хирургическая патология (острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, кишечная непроходимость, перфорация полого органа, мезентериальный тромбоз, ущемленная грыжа).
2. Акушерско - гинекологические заболевания (перекрут ножки кисты, нарушение питания миомы, перекрут субсерозного узла, осложнения беременности, родов и послеродового периода).
3. Заболевания, связанные с органами, которые расположены вне брюшной полости (болезни почек: острый пиелонефрит, почечная колика; заболевания легких – долевая пневмония; заболевания сердца)

# Симптоматика (оценка жалоб)

- Боль
  - Висцеральная или париетальная
  - Локализация
  - Иррадиация
  - Качественные характеристики (постоянная или периодическая)
  - Продолжительность боли
  - Интенсивность
  - Причина появления по мнению пациента
- Диспепсия
- Жажда
- Задержка стула и газов

# Симптоматика (осмотр, оценка общего состояния)

- Осмотр больного с оценкой общего состояния, которое может быть:
  - *Удовлетворительным* – отсутствие защитных патологических признаков при наличии нормального сознания, активного поведения и удовлетворительного самочувствия больного в данный момент
  - *Средней тяжести* при наличии некоторых невыраженных признаков нарушения жизненно важных функций организма, неугрожающих жизни больного в данный момент, при сохранении нормального состояния и активного поведения
  - *Тяжелым* - наличие патологических признаков, характеризующих выраженное нарушение жизненно важных функций организма, реально угрожающих жизни больного в настоящее время. При этом больной нуждается в постороннем уходе и, как правило, оказании экстренной хирургической помощи

# Симптоматика (осмотр, оценка нарушения сознания)

- оглушённость (ступор) – замедленные неадекватные реакции на обращение и болевые раздражители;
- сопор – сохранены реакции на болевые раздражители, отсутствие реакции на обращение;
- кома – это бессознательное состояние, полная нечувствительность к внешним раздражителям (в том числе болевым), отсутствие реакции на обращение;
- делирий – острая спутанность сознания, которая может проявляться как возбуждением, так и глубокой сонливостью. Характерны нарушения ориентировки во времени и пространстве, галлюцинации, иллюзии, бред.

# Шкала комы Глазго

КРИТЕРИЙ		ХАРАКТЕРИСТИКА		БАЛЛ	
Открытие глаз	Спонтанно		4		
	На голос		3		
	На боль		2		
	Нет ответа		1		
Речевой ответ	Ориентирован, может разговаривать		5		
	Дезориентирован, может разговаривать		4		
	Нечёткие ответы		3		
	Бессвязные звуки		2		
	Нет ответа		1		
Двигательные реакции	Адекватно по команде		6		
	На боль, целенаправленно (локализует боль)		5		
	На боль нецеленаправленно (отдёргивает от боли)		4		
	Сгибание от боли		3		
	Разгибание от боли		2		
	Нет движений		1		
<b>СОЗНАНИЕ</b>					
Ясное - 15	Оглушение		Сопор 8-10	Кома	
	Умеренное	14-13		Умеренная	6-7
	Глубокое	11-12		Глубокая	4-5
			Терминальная	3	

# Симптоматика (осмотр, продолжение)

- Оценка положения больного
  - Вынужденное
  - Свободное
- Оценка кожных покровов
  - Цвет
  - Температура
  - Влажность
  - Заостренность черт лица
- Состояние языка
  - Влажность
  - Чистота
  - Наличие налета
- Оценка слизистых
  - Влажность
  - Цвет



# Симптоматика (осмотр, продолжение)

- Осмотр живота
  - Форма
  - Симметричность
  - Участие в акте дыхания и его равномерность
  - Состояние кожных покровов
    - Наличие петехиальных кровоизлияний
    - Наличие расширенных вен (голова Медузы)

# Папальпация

- Поверхностная
  - Наличие болезненности, локализация
  - Защитное напряжение мышц
- Глубокая <sup>Симптоматика</sup> (осмотр, продолжение)
  - Определение наличия инфильтратов
  - Симптом Щеткина-Блюмберга
  - Симптом Куленкампа
  - Симптом Карнетта

# Перкуссия, аускультация

- Перкуссия
  - Наличие пневмоперитонеума
  - Наличие выпота в брюшной полости
  - Метеоризма
- Аускультация
  - Оценка перистальтики (усилена, ослаблена, отсутствует)
  - Шум плеска

# Общеклиническая симптоматика

- Пульс (чаще тахикардия), оценка в динамике
- АД, оценка в динамике
- Тахипноэ
- Температура тела
- Оценка стула (наличие, цвет, количество, оформленность)
- Оценка рвоты (наличие, цвет, количество)

# Диагностика

- Лабораторный скрининг (ОАК, ОАМ, сахар, биохимия, коагулограмма)
- ЭКГ
- Обзорная рентгенография ОГК
- УЗИ
- ЭГДС
- Диагностическая лапароскопия
- КТ, МРТ, ангиография

# Показания к экстренной операции при остром животе

- Острый аппендицит
- Перитонит
- Внутрибрюшное кровотечение
- Ущемленная грыжа
- Странгуляционная кишечная непроходимость
- Острые нарушения мезентериального кровообращения