

**М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан
университеті
Жоғарғы Медицина мектебі**



**Северо-Казахстанский университет им. М.
Козыбаева
Высшая школа медицины**



ВИРУСТЫҚ ГЕПАТИТТЕР

Аурудың таралуы және динамикасы



**Орындаған: Аманбаева А.Т.
ОМ – 18к – 1а
Қабылдаған: Қаныбек А.Қ.**

Петропавловск 2021



Вирустық гепатит

вирустардан туындаған бауырдың
жұқпалы аурулар тобы.




ДДҰ деректері бойынша жыл сайын әлемде цирроз бен
гепатоцеллюлярлық карциноманы қоса алғанда, жіті, созылмалы
гепатиттердің 2 млн. - ға дейін өлім-жітімі тіркеледі.



Қазақстан вирустық гепатиттер бойынша гиперэндемиялық өңір болып табылады.

Вирустық гепатиттер проблемасын зерттеудің өзектілігі олардың жоғары әлеуметтік, клиникалық-эпидемиологиялық және экономикалық маңыздылығымен байланысты.






Вирустық гепатиттердің барлық түрлерінің ішінде ең көп тарағаны А гепатиті болып табылады (90%).

Соңғы жылдарда елімізде 1,5 млн. адам ауырып, жыл сайын А вирустық гепатитінің 4-тен 60 мыңға дейінгі жағдайы тіркеледі.

Жұқтыру мен симптомдардың басталуы арасындағы кезең болып табылатын инкубациялық кезең, әдетте, шамамен бір айға созылады, бірақ 15-тен 50 күнге дейін кез-келген жерде болуы мүмкін және инфекция қан анализімен анықталуы мүмкін.






АҚШ-та А гепатитімен аурушандық: **2017** жылы АҚШ-та 3366 А гепатиті тіркелген, олардың саны екі еседен асады.

Дүниежүзілік: ДДҰ 2016 жылы 7 134 адамның өліміне А гепатиті себеп болды деп есептейді .

А вирустық гепатиті физикалық факторларға салыстырмалы түрде жоғары қарсылыққа ие РНҚ бар вирустан туындайды, соның арқасында вирус қоршаған ортада ұзақ уақыт сақталады.



Сырқаттанушылықтың жоғары деңгейі республиканың оңтүстік және оңтүстік-батыс өңірлерінде байқалады.





Қазақстанда вирустық гепатиттердің ресми тіркелетін нысандары-А және В гепатиттері



В және С гепатиті Еуропалық аймақтағы миллиондаған адамдарға әсер етеді


Әлемде 500 миллион адам В
немесе С гепатитін жұқтырған
деп есептеледі, бұл вирустар
жылына 1,5 миллион адамды
өлтіреді;





Распространенность генотипов вируса гепатита С


Вирусы генотипа 1, 2 и 3 составляют 98%
всех случаев инфицирования



Гепатит статистикасы бойынша инфекцияның қоздырғышының 3 генетикалық түрі кең таралған, бірақ басқалары да кездеседі. **2020 жылдың кезеңінде** С вирустық гепатитін жұқтырудың 5,8 млн жағдайы ресми түрде расталды.





Естественное течение HCV-инфекции






Жұқтыру статистикасы



- через кровь
- половым путем
- от матери к ребенку
- неустановленные причины
- через шприц при игольной наркомании



Статистика гепатита по возрасту и полу





Қорытынды

- Қан-вирустың таралуының негізгі "кінәсі";
- Гепатитпен ауыратын науқастың қан бөлшектерін сау адамның жарасына енгізу іс жүзінде инфекцияға әкеледі;
- Гепатит вирусының инфекциясының жыныстық берілу жолы өзекті болып қала береді;
- Вирус қоршаған орта жағдайында өзінің өміршеңдігін бірнеше күнге дейін сақтайды;
- Гепатитті тиімді және уақтылы емдеудің болмауы науқастың өмір сүру ұзақтығын орта есеппен 15-20 жылға қысқартады және көбінесе бауыр циррозынан, бауыр қатерлі ісігінен және гепатиттің басқа да ауыр асқынуларынан мезгілсіз өлімге әкеледі.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

- 1. В.И. Покровский [и др.].Инфекционные болезни и эпидемиология. Т.3.//.-М.: ГЭОТАРМедиа, 2013.-323с.- ISBN 978-5-9704-2578-7**
- 2. С.Амиреев. Иммунизация на практике: национальное рук.// Издательство «Эверо», Алматы -2014.- 68с, 188с.- ISBN 978-601-246-390-3**
- 3. Статистические данные Комитета Охраны Общественного Здоровья Министерства Здравоохранения Республики Казахстан за 2005-2016 гг.**

Спасибо за внимание!



**Мы храним честь
белого халата**