

Общая и частная психопатология:
определение, методические
подходы диагностики, лечения,
профилактики, наиболее
распространенные диагнозы



ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ

- Общая психопатология — изучает основные, свойственные многим психическим болезням, закономерности проявления и развития патологии психической деятельности, общие вопросы этиологии и патогенеза, природу психопатологических процессов, их причины, принципы классификации, методы исследования и лечения.

ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ

- При оценке психических расстройств выделяют два основных уровня (тяжесть):
 - Психотический (психоз)
 - -грубо нарушено поведение
 - -отсутствует критика к состоянию
 - -присутствуют такие тяжелые симптомы как бред, галлюцинации, выраженные колебания настроения
 - -сознание может быть помрачено
 - Непсихотический (невроз, психопатия)
 - -поведение грубо не нарушено,
 - -имеется критика (полная или неполная) к состоянию
 - -возможны самые разнообразные «нетяжелые» симптомы и синдромы
 - -сознание всегда ясное




- Симптомы нарушений в каждой сфере рассматриваются отдельно с последующим сопоставлением в синдромы, в которых патология отдельных сфер пересекается.



Нарушения ощущений и восприятия




РАССТРОЙСТВА ПАМЯТИ




ПАТОЛОГИЯ ЧУВСТВ




ПАТОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ



ДВИГАТЕЛЬНО - ВОЛЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ



СНИЖЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СЛАБОСТИ И СНИЖЕНИЯ



ЧАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ



- Частная психопатология — изучает отдельные психические заболевания, их этиологию, патогенез, клинику, закономерности развития, способы лечения и восстановления трудоспособности.

ЧАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ

- Все психические заболевания делят по этиологическому принципу на:
- •Эндогенные психозы: Шизофрения. Аффективное расстройство настроения (маниакально-депрессивный психоз)
- •Экзогенные и экзогенно-органическое поражение головного мозга.
- •Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ: Алкоголизм и наркомании.
- •Психогенные нарушения: неврозы и реактивные психозы.
- •Расстройства личности (психопатии).
-

Лечение и профилактика

- Для лечения обострений позитивной симптоматики и их профилактики используют антипсихотические препараты. В настоящее время существуют 2 поколения антипсихотиков:
 - • Препараты первого поколения (нейролептики). Вызывают экстрапирамидные побочные эффекты, не влияют на негативную симптоматику шизофрении.
 - Например, галоперидол (5-25 мг/сут), аминазин (25-200 мг/сут)
 - Данные препараты часто используются для купирования психомоторного возбуждения у больных шизофренией. Например, р-р галоперидола 0,5% 2,0 в/м (лучше сочетать с введением транквилизаторов, например, феназепама 0,1% 2,0 в/м) или р-р аминазина 2,5% 2,0 в/м (вызывает резкое снижение АД, сочетать с введением кордиамина 2,0 п/к).
- • Препараты второго поколения (атипичные антипсихотики). Не вызывают экстрапирамидные побочные эффекты, способны благоприятно влиять на негативную симптоматику шизофрении.
- Например, рисполепт 2-6 мг/сут, запрекса 5-20 мг/сут
- Симптоматически больным шизофренией могут дополнительно назначаться: транквилизаторы (для лечения тревоги и расстройств сна), корректоры экстрапирамидной симптоматики (например, циклодол 2-6 мг/сут), антидепрессанты.

Методы диагностики



- Клинико-психопатологический метод — основной метод диагностики и оценки динамики психических расстройств. В соответствии с разработанными Всемирной организацией здравоохранения диагностическими руководствами к Международной классификации болезней последних пересмотров (МКБ-10, 1992; МКБ-11, 2019) только клиническая оценка психического статуса пациента (за небольшим исключением) может быть использована для диагностики психического расстройства.
- Другие методы носят вторичный, дополнительный характер:
- — Экспериментально-психологический метод — в клинике используется для объективизации и количественной оценки некоторых показателей психической деятельности, что может быть важно для наблюдения пациентов в динамике, трудовой и медико-социальной экспертизы и пр. Показатели коэффициента интеллекта (IQ), получаемые с использованием специальных методик, используются для диагностики умственной отсталости.
- — Лабораторные, инструментальные методы, оценка соматического и неврологического статуса — в клинической психиатрии используются для подтверждения или исключения соматических или неврологических причин психических расстройств (например, выявление с помощью нейровизуализации поражения головного мозга сосудистой этиологии для подтверждения причины развития деменции, связанной с сосудистым заболеванием головного мозга). Для этих целей используются:
- Нейрофизиологические методы (ЭЭГ, МЭГ)
- Методы нейровизуализации (МРТ, КТ, ПЭТ)
- Клинические, биохимические, токсикологические исследования крови, мочи, спинномозговой жидкости
- Генетические исследования

Спасибо за внимание!

