

Интеллект и интеллектуальная недостаточность

Автор: Студентка 2 курса, группы об2-
лого2, Сазоненко Любовь Андреевна

Понятия

Интеллект - относительно устойчивая структура умственных способностей индивида, проявляющихся в различных сферах практической и теоретической деятельности.

Умственная отсталость - состояние задержанного или неполного развития психики, которое характеризуется нарушениями способностей, обеспечивающих общий уровень интеллектуальности (когнитивных, речевых, моторных и социальных).



Причины

- ❖ Патологии в пренатальном и натальном периодах. (гипоксия, интоксикации, инфекции, травмы при родах, асфиксия.)
- ❖ Нейроинфекции, черепно-мозговые травмы.
- ❖ Хронические соматические болезни.
- ❖ Педагогическая запущенность, включающая в себя когнитивную депривацию.



Классификация

1. Дизонтогенетический. (психический инфантилизм, парциальные задержки развития компонентов когнитивной деятельности, искаженное психическое развитие)
2. Энцефалопатический. Органические поражения ЦНС. (церебрастения, психоорганический синдром, ДЦП.)
3. Дизонтогенетически-энцефалопатический (смешанный). ОНР, ОНР с неврологическими и психопатологическими синдромами, моторная алалия.

Классификация по МКБ-10. (F70-F79)

F70.xz Легкая УО (IQ 50-69, результаты теста Векслера 60-79);

F71.xz Средняя УО (IQ 35-49, результаты теста Векслера 45-59);

F72.xz Тяжёлая УО (IQ 20-34, результаты теста Векслера 30-44);

F73.xz Глубокая УО (IQ < 20, результаты теста Векслера < 30);

F78.xz Другие формы УО;

F79.xz Неуточненная форма УО.

Классификация Э. Крепелина

- **Дебильность** - легкая степень олигофрении, отличающаяся характерными чертами интеллектуальной недостаточности в виде рутинности мышления, отсутствия способности к абстрактному мышлению.
- **Имбецильность** - умственная отсталость средней тяжести.
- **Идиотия** - наиболее тяжелая степень олигофрении, характеризующаяся практическим отсутствием психических реакций и речи, невозможностью усвоения простейших навыков.

Классификация олигофрений по В.В. Ковалеву

Основные клинические формы:

- ❖ Ретардация, т.е. стойкое психическое недоразвитие (общее или парциальное) или замедленное психическое развитие
- ❖ Асинхрония (дисгармоничное психическое развитие), которая включает признаки ретардации и акселерации.



Ретардация - отсутствие инволюции ранних форм психического развития. Отдельные периоды развития незавершенные. Это явление характерно для олигофрений, а также задержки психического развития.

Акселерация - ускорение роста и полового созревания детей и подростков по сравнению с предыдущими поколениями.



СИМПТОМЫ


- ❖ Нарушение функции произвольного внимания
- ❖ Нарушение восприятие пространственных отношений, ориентировка в собственном теле
- ❖ Наблюдается двигательная расторможенность, недоразвитие мелкой моторики
- ❖ Ограниченный словарный запас
- ❖ Низкие навыки самообслуживания
- ❖ Эмоциональная неустойчивость
- ❖ Отсутствие или недоразвитость речи



Диагностика

- ❖ Интеллект. (Тест Векслера)
- ❖ Память. (10 слов)
- ❖ Внимание (Таблицы Шульте)
- ❖ Мышление. (Исключение лишнего, понимание пословиц и метафор)

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 19 | 2 | 9 | 24 | 6 |
| 17 | 4 | 21 | 11 | 18 |
| 12 | 3 | 13 | 8 | 16 |
| 5 | 22 | 23 | 20 | 1 |
| 14 | 15 | 7 | 25 | 10 |



Спасибо за внимание!

