

Первообразная

*ГБПОУ СО «Сухоложский
многопрофильный техникум»
Преподаватель Соколова О.Б.*

Устная работа

Давайте вспомним правила нахождения производной функции

$$(x - 1)' = 1$$

$$(12 - x^4)' = -4x^3$$

$$(\sin x - 5)' = \cos x$$

$$(6x - 4x^3)' = 6 - 12x^2$$

$$(\cos x + 12x)' = -\sin x + 12$$

$$(7x + \sqrt{x})' = 7 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Устная работа

$$(x^3)' = 3x^2$$

$$(C)' = 0$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(4x)' = 4$$


$$(x^2 + 6x)' = 2x + 6$$

Используя определение производной функции, решают ряд задач в алгебре, физике, химии.

Вспомним физический смысл производной.

Если материальная точка движется прямолинейно и её координата изменяется по закону $s(t)$, то скорость её движения $v(t)$ в момент времени t равна производной $s'(t)$:

*материальная
точка*



скорость

движения $v(t)$

$$v(t) = s'(t)$$

*$s(t)$ закон
движения*



В математике часто приходится решать
обратную задачу:
зная скорость найти закон движения.

Задача: По прямой движется материальная точка, скорость которой в момент времени t задается формулой $v(t) = 3t^2$. Найдите закон движения.

Решение: Пусть $s(t)$ – закон движения

так как $v(t) = s'(t)$

$$s'(t) = 3t^2, \quad s(t) = t^3.$$

надо найти функцию, производная которой равна $3t^2$.

Эта задача решена верно, но не полно.

Эта задача имеет бесконечное множество решений.

$$s(t) = t^3$$

$$s'(t) = 3t^2$$

$$s(t) = t^3 + 2$$

$$s'(t) = 3t^2$$

$$s(t) = t^3 + 5$$

$$s'(t) = 3t^2$$

$$s(t) = t^3 + \frac{1}{2}$$

$$s'(t) = 3t^2$$

можно сделать вывод, что любая функция вида $s(t) = t^3 + C$ является решением данной задачи, где C любое число.

При решении задачи, мы, зная производную функции, восстановили ее первичный образ.

Эта операция восстановления - операция
интегрирования.

Восстановленная функция – **первообразная**
(первичный образ функции)

Операция нахождения производной -
→
дифференцирование

←
Операция нахождения первообразной -
интегрирование

Определение первообразной

$y = F(x)$ называют первообразной для $y = f(x)$ на промежутке X , если при $x \in X$

$$F'(x) = f(x)$$

Запомните: Первообразная – это родитель
производной: $F'(x)=f(x)$

Задача: Докажите, что функция $y = F(x)$ является
первообразной для функции $y = f(x)$, если:

а) $F(x) = x^2 + x^3$, $f(x) = 2x + 3x^2$

б) $F(x) = x^4 - x^{11}$, $f(x) = 4x^3 - 11x^{10}$

в) $F(x) = -4\cos x$, $f(x) = 4\sin x$

г) $F(x) = -9\sin x$, $f(x) = -9\cos x$

$f(x)$	$F(x)$
1	

Задача:

Найдите все первообразные для функций:

$$f(x)=3$$

$$f(x)=x^2$$

$$f(x)=\cos x$$

$$f(x)=12$$

$$f(x)=x^5$$

Три правила нахождения первообразных

Если функции $y=f(x)$ и $y=g(x)$ имеют на промежутке

первообразные соответственно $y=F(x)$ и $y=G(x)$, то

Функция	Первообразная
$y = f(x) + g(x)$	$y = F(x) + G(x)$
$y = k f(x)$	$y = k F(x)$

Задача.

Для функции $y=f(x)$ найдите хотя бы одну первообразную:

а) $f(x) = 4x^2 + 6x^2$

г) $f(x) = e^x + \frac{1}{x}$

б) $f(x) = -\sin x + 2\cos x$

д) $f(x) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$

в) $f(x) = -13\sin x + \frac{5}{\cos^2 x}$

г) $f(x) = (4 - 5x)^4$

Самостоятельно

Для функции $y=f(x)$ найдите хотя бы одну первообразную:

а) $f(x) = 3x^4 - 5x^2$

б) $f(x) = 3\cos x - \sin x$

в) $f(x) = \cos x + \frac{1}{\sin^2 x}$

г) $f(x) = \frac{1}{x} - 2e^x$

д) $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

е) $f(x) = (3x - 12)^4$

Первообразная

И какой новой операцией вертовикомидорся?
Как называется процесс нахождения
Что значит найти первообразную?
является обратной первообразной функцией?

Нахождение первообразной функции.

дифференцирование.

Найти первичный образ функции, т.е. вид функции до того как нашли её производную.

Спасибо за урок ...

