

09.06.20

Событие, вероятность события.

Сложение и умножение вероятностей.

Понятие о независимости событий.

Представление данных.

Видео для усвоения материала:

<https://infourok.ru/videouroki/1405>

<https://infourok.ru/videouroki/1406>

<https://infourok.ru/videouroki/1407>

<https://infourok.ru/videouroki/1259>

Теоретическая часть:

Прочитать.

Определения

(выделенное жирным шрифтом) – выучить.

Теория вероятности.

Всё, что происходит или не происходит в реальной действительности, называют явлениями или *событиями*. Практика показывает, что если некоторое событие происходит достаточно часто, то в его наступлении существует определённая закономерность.

Раздел математики, называемый *теорией вероятностей*, и занимается исследованием закономерностей в массовых явлениях.

Определение 1. Событие называют *случайным* по отношению к некоторому испытанию (опыту), если в ходе этого испытания оно может произойти, а может и не произойти.

Определение 2. Событие U называют *достоверным* по отношению к некоторому испытанию, если в ходе этого испытания событие U обязательно произойдёт.

Определение 3. Событие V называют *невозможным* по отношению к некоторому испытанию, если в ходе этого испытания событие V заведомо не произойдёт.

Пусть в определенном испытании могут произойти события A и B . Рассмотрим некоторые комбинации этих событий.

Определение 1. Суммой (объединением) событий A и B называется событие, которое состоит в том, что происходит хотя бы одно из данных событий. Сумму событий A и B обозначают $A + B$ (или $A \cup B$).

Определение 2. Произведением (пересечением) событий A и B называется событие, которое состоит в том, что происходят оба этих события. Произведение событий A и B обозначают AB (или $A \cap B$).

Например, если событие A — выпадение чётного числа, а событие B — выпадение числа, кратного 3, в результате одного броска игрального кубика, то событие AB — выпадение чётного числа, кратного 3 (такое число одно — это 6).

Определение 3. События A и B называют равными (равносильными) и пишут $A = B$, если событие A происходит тогда и только тогда, когда происходит событие B .

Например, если в испытании с одним бросанием игрального кубика событие A — выпало число 6, а событие B — выпало наибольшее из возможных чисел, то $A = B$.

Рассмотрим события A и \bar{A} (читается «а с чертой»), связанные с одним испытанием.

Определение 4. Событие \bar{A} называют противоположным событию A , если событие \bar{A} происходит тогда и только тогда, когда не происходит событие A .

Пусть событие A связано с испытанием, имеющим n равновозможных элементарных исходов. И пусть событие A наступает тогда, когда осуществляется любой из m каких-то элементарных исходов ($m \leq n$), и не наступает тогда, когда осуществляется любой из оставшихся $(n - m)$ исходов. Тогда говорят, что указанные m исходов, приводящие к событию A , благоприятствуют событию A .

Определение. Вероятностью $P(A)$ события A в испытании с равновозможными элементарными исходами называется отношение числа исходов m , благоприятствующих событию A , к числу n всех исходов испытания.

Таким образом,

$$P(A) = \frac{m}{n}, \text{ где } m \leq n. \quad (1)$$

Пример:

Задача

Бросают две монеты. Найти вероятность события A — хотя бы на одной монете выпал орёл.

► Обозначим появление орла на выпавшей монете буквой «О», а появление решки — буквой «Р». Тогда равновозможны следующие четыре ($n = 4$) элементарных исхода испытания: ОО, ОР, РО, РР (в каждой паре на первом месте записан результат появления орла или решки на первой монете, на втором месте — на второй монете). Событию A благоприятствуют первые 3 пары исходов ($m = 3$).

Поэтому $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{3}{4}$.

Ответ

$\frac{3}{4}$. ◀

Практическая часть.

Сегодняшняя практическая часть – подготовка к экзамену (следующий файл)