



Biologische Heilmittel Heel GmbH r - s

Ranunculus-Homaccord (Ранункулюс-Гомаккорд)

- Капли: 100 г содержат:
- *Ranunculus bulbosus* Д2, Д10, Д15, Д30, Д200,
- *Asclepias tuberosa* Д4, Д10, Д20, Д30, Д200 по 0,5 г. Содержит алкоголя 35 объемных %.

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- *Ranunculus bulbosus* Д4, Д10, Д15, Д30, Д200,
- *Asclepias tuberosa* Д6, Д10, Д20, Д30, Д200 по 5,5 МКЛ

Ranunculus-Homaccord (Ранункулюс-Гомаккорд)

- Межреберная невралгия, плевральные боли, опоясывающий лишай.
- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут. Длительная терапия допускается только под наблюдением врача.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю п/к, в/м, в/к, в/в.

Ranunculus-Номасскорд (Ранункулюс-Гомаккорд)

- Ranunculus-Номасскорд назначается при межреберной невралгии, при экссудативном плеврите (наряду с Mezereum-Номасскорд, Variolinum-Injeel, Vaccininum-Injeel, Engystol N).

Ranunculus-Homaccord (Ранункулюс-Гомаккорд)

- Данный препарат также показан при ревматизме, ухудшениях состояния при перемене погоды, неврите, сопровождающемся тянущими болями; при гриппе в сочетании с болями в области ребер, при везикулезных экземах.

Ranunculus-Homaccord (Ранункулюс-Гомаккорд)

- Экспериментально применяется при воспалении наружного уха, пузырьчатке, при болях в костях, при гноящихся экземах на голове и на суставах пальцев, а также для вспомогательной терапии при зуде.

Ranunculus-Номасскорд (Ранункулюс-Гомаккорд)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов в сочетании с Bryasoneel, Colocynthis-Номасскорд, Spascupreel, Mezereum-Номасскорд, Gripp-Heel, Aconitum-Номасскорд. Парентеральная терапия: 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу (неврально).

Rauwolfia compositum

(Раувольфия композитум)

- 2,2 мл содержат:
- Rauwolfia serpentina Д3,
- Aurum iodatum Д10, Kalmia Д4,
- Melilotus officinalis Д8, Sulfur Д10,
- Belladonna Д6, Arnica Д4, Conium Д3,
- Viscum album Д3, Lycoperodium Д6,
- Cynara scolymis Д8, **Ren suis Д10,**
- **Hepar suis Д10** по 22 мкл.

Rauwolfia compositum

(Раувольфия композитум)

- Повышенное кровяное давление, эссенциальная гипертония.
- Как правило, 1-3 раза в неделю по 1 ампуле в/в, в/м, п/к, и в/к.

Rauwolfia compositum

(Раувольфия композитум)

- Rauwolfia compositum назначается при различных видах гипертонии, особенно при эссенциальной гипертонии; при этом воздействие осуществляется не только симптоматически за счет компонентов Rauwolfia, Viscum, Belladonna, Melilotus, но и за счет антисклеротического действия Aurum jodatatum, регуляции кровообращения Arnica, повышения дезинтоксикационных функций (Sulfur, Lycoperodium, Cynara scolymus, Hepar). Сочетание данных потенцированных препаратов активизирует почечные функции (особенно функции экскреции) и направлено на устранение причин гипертонии.

Rauwolfia compositum

(Раувольфия композитум)

- В особо тяжелых случаях попеременно назначаются Ubichinon compositum, Coenzyme compositum, Hepar compositum, Testis compositum, Ovarium compositum, Angio-Injeel, Cralonin, Solidago compositum S (при нарушениях функций почек), Thyreoidea compositum (для активации функций гормонов и предотвращения новообразований).

Rauwolfia compositum

(Раувольфия композитум)

- Перорально могут применяться *Aesculus compositum* (нарушения периферического кровоснабжения), *Populus compositum* (простата и нарушения почечной экскреции), *Syzygium compositum* (при диабете).

Rauwolfia compositum

(Раувольфия композитум)

- При соответствующих показаниях могут назначаться Nereel (заболевания печени), Cralonin и Angio-Heel (регуляция сердечной деятельности), Zeel (ревматизм, артрит), а при процессах регрессивной викариации, сопровождающихся воспалениями, Traumeel S, Gripp-Heel, Echinacea compositum S.

Rauwolfia compositum

(Раувольфия композитум)

- Также при гипертонии показана дополнительная парентеральная терапия препаратами Carbo compositum, Placenta compositum, Cerebrum compositum, Cor compositum, Angio-Injeel, Circulo-Injeel, Hepar compositum (в зависимости от сопутствующих симптомов).

Rauwolfia compositum

(Раувольфия композитум)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутривенно и в кожу в сочетании с дополнительными показанными препаратами.

Reneel (Ренель)

- 1 таблетка содержит:
- Berberis Д2 15 мг, Acidum nitricum Д4,
- Cantharis Д5, Plumbum aceticum Д6,
- Pareira brava Д3, Sabal serrulatum Д2 по 30 мг,
- Causticum Hanemannii Д4 60 мг,
- Alumina Д12 75 мг.

Ренеел (Ренель)

- Воспалительные заболевания в области мочеиспускательного канала, с и без камнеобразования.

Reneel (Ренель)

- обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают по 1 таблетке каждые 15 минут (в течение не более чем 2 часов).

Reneel (Ренель)

- Reneel назначается при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей в сочетании с образованиями камней или без них, например, при цистите, цистопиелите, почечнокаменной болезни.

Reneel (Ренель)

- Данный препарат показан для вспомогательной терапии при аденоме простаты (наряду с Sabal-Номассорд, Berberis-Номассорд, Plantago-Номассорд), при гидронефрозе (наряду с Traumeel S, Mercurius-Heel S и т.п.), при почечных коликах (вместе с Berberis-Номассорд, Spascupreel, Plantago-Номассорд, Albumoheel S), при болях в спине по утрам, особенно в области почек; при недержании мочи.

Reneel (Ренель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 1 таблетке под язык, а при острых заболеваниях для иницирующей терапии - каждые 15 минут по 1 таблетке под язык в течение 1-2 часов.

Rheuma-Heel (Реума-Хель)

- 1 таблетка содержит:
- *Rhus toxicodendron* Д6,
- *Bryonia* Д4,
- *Causticum Hahnemanni* Д4,
- *Arnica* Д4,
- *Ferrum phosphoricum* Д6 по 60 мг.

Rheuma-Heel (Реума-Хель)

- Ревматизм мягких тканей, периартритные нарушения.
- Обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день.

Rheuma-Heel (Реума-Хель)

- Rheuma-Heel назначается при ревматизме суставов и мягких тканей, при гриппе, сопровождающемся болями в конечностях; при утомлении мышц, сопровождающемся болью (вместе с Traumeel S), при тифозных лихорадках и при невралгиях (наряду с Dulcamara-Номaccord, Spascupreel, Colocynthis-Номaccord),

Rheuma-Heel (Реума-Хель)

- при межреберной невралгии, невралгиях затылочного и седалищного нервов (вместе с Colocynthis-Номассорд, Gelsemium-Номассорд, Ranunculus-Номассорд), при коксите (в сочетании с Graphites-Номассорд, Dulcamara-Номассорд, Lithiumeel, Cruroheel S, Rhododendroneel S, Bryaconeel и т.п.)

Rheuma-Heel (Реума-Хель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 1 таблетке под язык, а при иницилирующей терапии - каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов.

Rhododendroneel S (Рододендронель С)

- 100 г содержат:
- Rhododendron Д3 10 г,
- Spiraea ulmaria Д3,
- Asclepias tuberosa Д6,
- Euphorbia cyperarissias Д3, Dulcamara Д4,
- Ledum Д4, Aconitum Д4 по 10 г,
- Stellaria media Д2, Lithium benzoicum Д3,
- Pulsatilla Д3, Acidum benzoicum Д3 по 5 г.

Содержит алкоголя 35 объемных %.

Rhododendroneel S (Рододендронель С)

- Невралгия, ревматизм мягких тканей и артритические нарушения, особенно в случаях обострения при влажной погоде.
- Обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.

Rhododendroneel S

(Рододендронель С)

- Rhododendroneel S назначается при ревматизме и невралгиях различной локализации и происхождения в сочетании с ухудшениями состояния при влажной погоде, например, при невралгиях рук, при межреберной невралгии, первичном хроническом полиартрите, катаре евстахиевой трубы, при повышенной общей чувствительности к перемене погоды, при опоясывающем лишае. Данный препарат особенно показан при ревматических болях по ночам и при латентном ревматизме.

Rhododendroneel S

(Рододендронель С)

- Попеременно могут назначаться инъекции Bryaconeel (невралгии рук, колющие боли), Dulcamara-Homaccord (межреберная невралгия, чувствительность к перемене погоды), Ferrum-Homaccord, Osteoheel S, Cruroheel S (эпикондилит), Colocynthis-Homaccord (невралгии седалищного нерва и прочие виды невралгии, вызванные заболеваниями позвоночника), Gelsemium-Homaccord (невралгия затылочного нерва и невралгия рук), Abropernol, Graphites-Homaccord, Lithiumeel, Bryaconeel (при коксите), Discus compositum. При эпидимическом паротите дополнительно применяются Reneel и Bryaconeel, а при эпидидимите - Psorinoheel.

Rhododendroneel S (Рододендронель С)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет при острых заболеваниях каждые 15-30 минут по 10 капель в течение 1-2 часов. Позже - 2-4 раза в сутки по 10 капель.

Sabal-Номассорд

(Сабаль-Гомаккорд)

- Капли: 100 г содержат:
 - *Sabal serrulatum* 0,9 г, Д10, 30 по 0,3 г,
 - *Hepar sulfuris* Д10, Д15, Д30, Д200 по 0,7 г.
Содержит алкоголя 45 объемных %.
-
- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
 - *Sabal serrulatum* Д2, Д10, Д30 по 3,3 мкл,
 - *Hepar sulfuris* Д12, Д15, Д30, Д200 по 7,7 мкл.

Sabal-Номассорд

(Сабаль-Гомаккорд)

- Первая степень аденомы простаты (при внешнем осмотре увеличение простаты), цисталгия.

Sabal-Нотассорд

(Сабаль-Гомаккорд)

- Капли: Обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут. Длительная терапия допускается только под наблюдением врача.
- Раствор для инъекций: В острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раз в неделю п/к, в/к, в/м, в/в.

Sabal-Нотассорд (Сабаль-Гомаккорд)

- Sabal-Нотассорд назначается при аденоме простаты, простатите, воспалениях и раздражениях мочеполовых путей, при цистите, а также для вспомогательной терапии при почечнокаменной болезни, гидронефрозе и цистопиелите.

Sabal-Номассорд (Сабаль-Гомаккорд)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 10 капель, при нарушениях мочеиспускания - иницирующая терапия: каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов, в сочетании с Reneel (заболевания мочеполовых органов), Spascupreel (спазмы, странгурия), Berberis-Номассорд (почечнокаменная болезнь), Traumeel S (инфекции мочеполовых органов), Populus compositum S, Solidago compositum S.

Sabal-Нотассорд (Сабаль-Гомаккорд)

- Парентеральная терапия: при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу.

Schwef-Heel (Швевф-Хель)

- 100 г содержат:
- Sulfur Д4, Д6, Д12, Д30, Д200 по 20 г.
Содержат алкоголя 85 объемных %.
- Дерматозы, склонные к раздражению
экземы, пиодермия; стимуляция защитных
механизмов.

Schwef-Heel (Швевф-Хель)

- В общих случаях по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут. Длительная терапия допускается только под наблюдением врача.

Schwef-Heel (Швевф-Хель)

- Schwef-Heel назначается при дерматозах, экземах, пиодермии, зуде, чесотке, детской папулезной крапивнице, крапивнице, дерматомикозах, опрелостях и т.п. Он противодействует гомотоксинам, в том числе, бактериям и грибкам. Дополнительно показаны Psorinoheel, Sulfur-Heel, Abropernol, Graphites-Homaccord, Traumeel S, Mercurius-Heel S, Lamioflur, Phosphor-Homaccord, Galium-Heel, Lymphomyosot (способствующие выведению шлаков из мезенхимы и соединительной ткани).

Schwef-Heel (Швевф-Хель)

- Сера в потенцированной форме показана при заболеваниях различных фаз для активации иммунных механизмов, особенно в тех случаях, когда поражены ферментные системы.

Schwef-Heel (Швевф-Хель)

- Данный препарат показан как реакционное средство (наряду с Engystol N, Traumeel S, Sulfur-Injeel, Hepar sulfuris-Injeel, кислотами цикла лимонной кислоты, суис-органическими препаратами, Cystein-Injeel, Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot), так как он в кишечнике преобразует серу в сероводород и активизирует тем самым сульфидные ферменты.

Schwef-Heel (Швевф-Хель)

- При фазах импрегнации он показан при бронхиальной астме, поражениях печени, мигренях, грудной жабе, язве двенадцатиперстной кишки. При фазах депонирования - при ревматизме, артрите, запорах, кожных заболеваниях, зуде различного происхождения и т. п. Таким образом, данный препарат может назначаться практически при всех фазах заболеваний (необходимо крайне осторожное применение при новообразованиях и туберкулезе).

Schwef-Heel (Швевф-Хель)

- Прочие показания: повышенное потоотделение различной локализации и причин (вместе с Psorinnoheel, Abropernol, Phosphor-Номассорд), диарея по утрам (наряду с Diarrheel S), себорея, экземы при ней, зуд, геморрой с выделениями слизи, покраснения губ и ушей. Многие пациенты, которым необходим данный препарат, выглядят грязными, от них плохо пахнет; при этом также необходимо назначать Psorinoheel, Traumeel S, Psorinum-Injeel, Colocynthis-Номассорд, Arnica-Heel - при неприятном запахе изо рта. Он также показан при застойной пневмонии (дополнительно - парентеральная терапия Sulfur-Injeel (+forte) и Engystol N).

Schwef-Heel (Швевф-Хель)

- Терапевтический эффект Schwef-Heel дополняется действием препаратов Heparin, Lycopodium-Injeel (+forte), Injeel-Chol, Chelidonium-Homaccord, Nuxvomica-Homaccord.

Schwef-Heel (Швевф-Хель)

- При большинстве из названных выше показаний может назначаться ступенчатая аутогемотерапия препаратами Schwef-Heel, Engystol N, Sulfur-Injeel, Нереел, суис-органическими препаратами и т.п.

Schwef-Heel (Швевф-Хель)

- При ослаблениях памяти наряду со Schwef-Heel применяются Varijodeel, Selenium-Номассорд, Anacardium-Номассорд.

Schwef-Heel (Швевф-Хель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов, в сочетании с другими показанными препаратами. Для парентеральной терапии назначается Sulfur-Injeel, имеющий те же показания.

Selenium-Нотассорд (Селениум-Гомаккорд)

- Капли: 100 г содержат:
- Selenium Д10, Д15, Д30, Д200,
- Kalium phosphoricum Д2, Д10, Д30, Д200 по 0,5 г.
Содержит алкоголя 35 объемных %.

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- Selenium Д10, Д15, Д30, Д200,
- Kalium phosphoricum Д6, Д10, Д30, Д200 по 5,5
МКЛ.

Selenium-Номассорд (Селениум-Гомаккорд)

- Снижение умственных способностей, особенно в результате атеросклероза.

Selenium-Номассорд (Селениум-Гомаккорд)

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. Длительная терапия допускается только под наблюдением врача.
- Раствор для инъекций: 1 ампула п/к, в/к, в/в 1-3 раза в неделю.

Selenium-Нотассорд (Селениум-Гомаккорд)

- Selenium-Нотассорд назначается при нарушениях функций головного мозга, при неврастении, последствиях умственного перенапряжения, при вегетативной дистонии и прочих фазах импрегнации нейродермы (симпатикодермы), а также для вспомогательной терапии при язве двенадцатиперстной кишки.

Selenium-Номассорд (Селениум-Гомаккорд)

- Эффект данного препарата может быть дополнен применением *Cerebrum compositum*.

Selenium-Номассорд (Селениум-Гомаккорд)

- Данный препарат также показан при ослаблениях памяти (вместе с Psorinoheel, Anacardium-Номассорд, Varijodeel, Nervoheel, Schwef-Heel), при меланхолии (вместе с Nervoheel, Ypsiloheel, Ignatia-Номассорд), при сонливости (наряду с Rhododendroneel S, Valerianaheel),

Selenium-Номасскорд (Селениум-Гомаккорд)

- при недержании мочи (вместе с Reneel, Plantago-Номасскорд), импотенции (наряду с Galium-Heel, Phosphor-Номасскорд, Coccus-Номасскорд, China-Номасскорд S), при поллюциях, слабых родовых схватках; при кожных высыпаниях, зуде, пустулах (наряду с Schwef-Heel, Psorinoheel, Traumeel S, Mercurius-Heel S), при выпадении волос (вместе с Psorinoheel).

Selenium-Nomaccord (Селениум-Гомаккорд)

- Он также показан при гипогликемии в сочетании с головокружениями Selenium-Nomaccord эффективно дополняет действие других биологических препаратов, активизируя функции головного мозга и симпатического нерва, особенно при терапии недоразвитых детей, последствий родовых травм и имбецильности (длительная терапия Lymphomyosot, Normeel S, Nervoheel, Calcoheel, Neuro-Injeel, Tonico-Injeel, Cerebrum suis-Injeel, катализаторами цикла лимонной кислоты).

Selenium-Номассорд (Селениум-Гомаккорд)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 10 капель. Парентеральная терапия - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу в сочетании с дополнительными показанными препаратами.

Solidago compositum S (Солидаго КОМПОЗИТУМ S)

- 2,2 мл содержат:
- Solidago Д3, Berberis Д4,
- Vesica urinaria suis Д8, Pielon suis Д10,
- Ureter suis Д10, Urethra suis Д10, Terebinthina Д6,
- Hydrargyrum bichloratum Д8, Acidum arsenicosum Д28,
- Cuprum sulfuricum Д6, Bucco Д8, Hepar sulphuris Д10,
- Capsicum Д6, Orthosiphon stamineus Д6,
- Equisetum hiemale Д4, Pareira brava Д6, Cantharis Д6,
- Apisinum Д8, Baptisia Д4, Natrium pyruvicum Д10,
- Pyrogenium Д198, Sarsaparilla Д6, Colibacillinum Д13,
- Coxackie-virus A9 Д8, Argentum nitricum Д6 по 22 мкл.

Solidago compositum S (Солидаго КОМПОЗИТУМ S)

- Активизация иммунных механизмов при острых и хронических заболеваниях почек и мочеиспускательного тракта, таких как циститы, цистопиелиты, камни в почках, гидронефрозы, ночные энурезы, недержание мочи, 1 стадия аденомы простаты, сужение мочеиспускательного канала, нефрозы, нефросклерозы, гипертония, при остром гломерулонефрите; для стимуляции экстреторных функций почек, в т. ч. в случае гипергидрозов, потливости ступней ног, экзем.

Solidago compositum S (Солидаго КОМПОЗИТУМ S)

- В острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле п/к, в/м, в/к, или в/в.

Solidago compositum S (Солидаго КОМПОЗИТУМ S)

- Solidago compositum S назначается при острых и хронических заболеваниях почек и мочевыводящих путей, например, цистите, цистопиелите, почечнокаменной болезни, гидронефрозе, ночном недержании мочи, при первой стадии аденомы простаты, сужении мочеиспускательного канала, нефрозе и нефросклерозе, при гипертонии, остром гломерулонефрите, а также для активации экскреторных функций почек при повышенном потоотделении, эмфиземах, эклампсии, экземах; для вспомогательной терапии при заболеваниях печени.

Solidago compositum S (Солидаго КОМПОЗИТУМ S)

- На важное значение почек при выведении из организма гомотоксинов-гомотоксонов указывает хотя бы возросшее в последнее время число пациентов с нарушениями экскреторных функций (вследствие аллопатической терапии и загрязнения окружающей среды).

Solidago compositum S (Солидаго КОМПОЗИТУМ S)

- Дополнительно рекомендуется применять Berberis-Homaccord, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum (для активации ферментных систем), Hepar compositum, Thyreoidea compositum, Rauwolfia compositum (при эксцессивной гипертонии), Traumeel S, Engystol N (попеременно), Atropinum compositum, Nieren-Elixier S (при почечных коликах), Cantharis compositum вместе с Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel (при цистопиелонефрите и пиурии).

Solidago compositum S (Солидаго КОМПОЗИТУМ S)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки в сочетании с Traumeel S и Echinacea compositum S, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу.

Spascipreel (Спаскупрель)

Spascipreel S (Спаскупрель С)

- Таблетки: 1 таблетка содержит:
- Colocynthis Д4, Ammonium bromatum Д4,
- Atropinum sulfuricum Д6, Veratrum Д6,
- Magnesium phosphoricum Д6,
- Gelsemium Д6 по 30 мг,
- Passiflora incarnata Д2, Agaricus Д4,
- Chamomilla Д3, Cuprum sulfuricum Д6 по 15 мг,
Aconitum Д6 60 мг.

Spascupreel (Спаскупрель)

Spascupreel S (Спаскупрель С)

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- Colocynthis Д4, Ammonium bromatum Д4,
- Atropinum sulfuricum Д6, Veratrum Д6,
- Magnesium phosphoricum Д6,
- Gelsemium Д6 по 1,1 мкл,
- Passiflora incarnata Д2, Agaricus Д4,
- Chamomilla Д3, Cuprum sulfuricum Д6 по 0,55 мкл,
- Aconitum Д6 2,2 мкл.

Spascupreel (Спаскупрель)

Spascupreel S (Спаскупрель С)

- Свечи: 1 свеча содержит:
- Colocynthis Д3, Ammonium bromatum Д3,
- Atropinum sulfuricum Д5, Veratrum Д5,
- Magnesium phosphoricum Д6,
- Gelsemium Д5 по 1,1 мг,
- Passiflora incarnata Д1, Chamomilla Д2,
- Cuprum sulfuricum Д5, Agaricus Д3 по 0,55 мг,
- Aconitum Д5 2,2 мг.

Spascipreel (Спаскупрель)

Spascipreel S (Спаскупрель С)

- Спазмы гладких мышц полых органов (желудок, кишечник, желчный пузырь, матка, мочеиспускательный канал), спазмы поперечно полосатой мускулатуры (миогелозы, утомленные мышцы).

Spascupreel (Спаскупрель)

Spascupreel S (Спаскупрель С)

- **Таблетки:** обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день, в острых случаях доза в 1 таблетку может быть назначена каждые 15 минут.
- **Раствор для инъекций:** В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле в/в, в/м, п/к, в/к.

Spascipreel (Спаскупрель)

Spascipreel S (Спаскупрель С)

- Свечи: Если нет других предписаний, 1 свеча 2-3 раза в день, при острых болях вставлять 1 свечу каждый час в заднее проходное отверстие. Для детей до 6 месяцев 1/2 свечи 1 раз.

Spascupreel (Спаскупрель)

Spascupreel S (Спаскупрель С)

- Spascupreel назначается при более или менее выраженных болях полых органов, при судорожных состояниях, например, коликах желчного пузыря, холецистопатиях, спазмах при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, спастическом колите, почечных коликах, при дисменоррее, тенезмах мочевого пузыря; при различных формах бронхиальной астмы и спастического бронхита, при спазмах гортани, например, при ложном крупе и коклюше.

Spascurreel (Спаскупрель)

Spascurreel S (Спаскупрель С)

- Данный препарат также показан при зубных судорогах у младенцев, при пупочных коликах, спазмах сосудов, мигрени, мышечном напряжении (миалгии, миогелозах) различного происхождения, например, при рефлекторном сжатии мышц при остеохондрозе.

Spascupreel (Спаскупрель)

Spascupreel S (Спаскупрель С)

- Одновременно рекомендуется применять препараты Chelidonium-Номассcord, Injeel-Chol, Нереel (при коликах желчного пузыря), Reneel, Berberis-Номассcord (при почечных коликах), Tonico-Injeel, Engystol N, Galium-Heel, Carbo vegetabilis-Injeel, Bryonia-Injeel forte, Veratrum album-Injeel forte, Ignatia-Номассcord (при бронхиальной астме).

Spigelon (Спигелон)

- Таблетки: 1 таблетка содержит:
- Spigelia ДЗ, Belladonna ДЗ,
- Bryonia ДЗ, Gelsemium ДЗ,
- Melilotus officinalis ДЗ,
- Natrium carbonicum ДЗ по 30 мг,
- Acidum silicicum Д12,
- Thuja Д12 по 60 мг.

Spigelon (Спигелон)

- Капли: 100 г содержат:
- Spigelia ДЗ, Belladonna ДЗ,
- Bryonia ДЗ, Gelsemium ДЗ,
- Melilotus officinalis ДЗ,
- Natrium carbonicum ДЗ по 10 г,
- Acidum silicicum Д12,
- Thuja Д12 по 20 г.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.

Spigelon (Спигелон)

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- Spigelia ДЗ, Belladonna ДЗ,
- Bryonia ДЗ, Gelsemium ДЗ,
- Melilotus officinalis ДЗ,
- Natrium carbonicum ДЗ по 1,1 мкл,
- Acidum silicicum Д12,
- Thuja Д12 по 2,2 мкл.



Spigelon (Спигелон)

- Головная боль.

Spigelon (Спигелон)

- Таблетки: обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях 1 таблетка каждые 15 минут.
- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, в других случаях по 10 капель каждые 15 минут.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю 1 ампула п/к, в/м, в/к, в/в.

Spigelon (Спигелон)

- Spigelon назначается при головных болях различного происхождения, особенно на нервной почве, при шейных мигренях, невралгиях затылочного и тройничного нерва, при конституциональных головных болях, например, после перенапряжений без каких-либо патологических причин, а также для вспомогательной терапии с другими биологическими препаратами при головных болях вследствие лихорадки, гриппа, ангины, после употребления алкоголя, перед менструациями.

Spigelon (Спигелон)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет при острых болях - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов, в прочих случаях - 3 раза в сутки по 1 таблетке или 10 капель. Парентеральная терапия: при острых болях - 1 ампула в сутки, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу (неврально, сегментно).

Spigelon (Спигелон)

- Данный препарат может назначаться для пациентов любого возраста. Он не замедляет реакции у водителей. Во многих случаях рекомендуется применять сочетание различных биологических препаратов. А при головных болях вследствие шейных нарушений рекомендуется коррекция осанки по Александеру.

Strophanthus compositum

(Строфантус композитум)

- 2,2 мл содержат:
- Strophanthus Д6, Acidum arsenicosum Д10,
- Aconitum Д6, Latrodectus mactans Д10,
- Acidum sacrolacticum Д4, Spigelia Д4,
- Cactus Д3, Veratrum Д4,
- Aethusa Д8, Tabacum Д10,
- Glonoinum Д4, Carbo vegetabilis Д10,
- Tormentilla Д6 по 22 мкл.

Strophantus compositum

(Строфантус композитум)

- Антигомотоксическое регулятивное воздействие при нарушениях кровоснабжения сердца, для профилактики и терапии инфаркта миокарда.
- 3-7 раз в неделю по 1 ампуле в/м, в/в, п/к, в/к.

Strophanthus compositum

(Строфантус композитум)

- Strophanthus compositum назначается при нарушениях кровоснабжения сердца, для профилактики и терапии инфаркта миокарда.
- Действие данного препарата направлено на симптоматику сердечных и коронарных заболеваний, при этом не только на само сердце, но и на такие симптомы как тошнота (

Strophantus compositum

(Строфантус композитум)

- Aethusa, Tabacum), холодный пот (Veratrum), состояния страха (Arsenicum album, Aconitum, Tabacum), симптомы грудной жабы (Lactodectus mactans, Spigelia, Cactus, Glonoinum). При этом клинически и экспериментально доказано, что Glonoinum расширяет коронарные сосуды и препятствует кровотоку в ткани (Tormentilla). Acidum sacrolacticum снимает повышенную кислотность тканей, которая может привести к инфаркту.

Strophanthus compositum

(Строфантус композитум)

- Дополнительно могут назначаться препараты Cactus compositum (внутривенно, перорально), Cralonin, Veratrum-Homaccord, Vomitusheel, Cardiacum-Heel, при этом все эти препараты назначаются для пациентов после инфаркта по 1 разу в сутки в течение длительного времени. Также показаны инъекции (1-2 раза в неделю) препаратов Cor compositum, Cactus compositum, Strophanthus compositum.

Strophantus compositum

(Строфантус композитум)

- Carbo compositum активизирует процессы связывания (при опасности апоплексического удара), а при повышении кровяного давления рекомендуется Rauwolfia compositum (попеременно).

Strophanthus compositum

(Строфантус композитум)

- Дополнительные препараты назначаются в зависимости от конкретного заболевания и его симптомов; ими могут быть Cardiacum-Heel, Cralonin, Glonoin-Homaccord и т.п.
- Для терапии последствий инфаркта миокарда в соответствии с симптомами применяются Angio-Injeel, Cactus compositum, Carbo compositum, Strophanthus compositum.

Strophantus compositum

(Строфантус композитум)

- Принципиальное значение в подобных случаях имеет вид инъекции (внутривенно, внутримышечно, подкожно или в кожу). Наиболее слабое воздействие оказывает Angio-Injeel, но и другие препараты также могут инъекцироваться внутривенно (Cactus compositum, Strophanthus compositum).

Strophantus compositum

(Строфантус композитум)

- При коллапсе и опасности аноплексии показаны внутривенные инъекции Carbo compositum, инъекции Strophanthus compositum и Cactus compositum (внутримышечно, подкожно или в кожу; возможны инъекции смеси с Angio-Injeel по методу "волдыря" в верхнюю часть груди); также показана пероральная терапия Cralonin и Cactus compositum.

Strophantus compositum

(Строфантус композитум)

- Для снятия болевых симптомов и оптимизации коронарного кровоснабжения может применяться Cardiacum-Heel.

Strophantus compositum

(Строфантус композитум)

- При болях, отдающихся в руки, показаны сердечные капли (Cosmochema), Strophantin compositum (таблетки от сердца) и Kalmia compositum. Aurumheel действует при выраженных ослаблениях миокарда, при этом наибольший эффект имеет попеременная терапия с Cralonin (капли).

Strophantus compositum

(Строфантус композитум)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в неделю по 1 ампуле. Для терапии последствий инфаркта миокарда - попеременно с *Cactus compositum*, *Cor compositum*, *Carbo compositum* и т.п.

Strumeel (Струмель), Strumeel forte N (Струмель форте Н)

- Таблетки: 1 таблетка содержит:
- Spongia Д3 150 мг,
- Calcium jodatum Д4 90 мг,
- Acidum silicicum Д4,
- Fucus vesiculosus Д4 по 30 мг

(1 таблетка содержит 9,3 мкг йода).

Strumeel (Струмелъ), Strumeel forte N (Струмелъ форте Н)

- Капли: 100 г содержат:
- Spongia Д2 50 г,
- Calcium jodatum Д3 30 г,
- Acidum silicicum colloidalе Д3,
- Fucus vesiculosus Д3 по 10 г
(10 капель содержит 70 мкг йода).
Содержит алкоголя 40 объемн. %.

Strumeel (Струмел), Strumeel forte N (Струмел форте Н)

- Зоб паренхиматозный (диффузный, ювенильный-юношеский), профилактика зоба, атеросклерозы и другие состояния, где показано применение йода.

Strumeel (Струмел), Strumeel forte N (Струмел форте Н)

- Дозы должны быть подобраны индивидуально.
- Таблетки: обычно сосать 1 таблетку 3 раза в день.
- Капли: обычно 10 капель 3 раза в день.

Strumeel (Струмел), Strumeel forte N (Струмел форте Н)

- Strumeel назначается для терапии йодом при паренхимном зобе (Strumeel forte N), для профилактики зоба (Strumeel - таблетки), при артериосклерозе, коронарном склерозе, для вспомогательной терапии при аневризме аорты (наряду с Kalmia-Injeel forte, Barijodeel, Mercurius jodatus flavus-Injeel),

Strumeel (Струмел), Strumeel forte N (Струмел форте Н)

- при гипертонии, ожирении, скрофулезных опуханиях желез, ретикулезе (наряду с Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel, Traumeel S), при кашле при крупе (вместе с Husteel, Aconitum-Homaccord).

Strumeel (Струмель), Strumeel forte N (Струмель форте Н)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 2-4 раза в сутки по 1 таблетке или 3 раза в сутки по 2 таблетки; 2 раза в сутки по 5 капель (для профилактики) или 3 раза в сутки по 10-20 капель (для терапии). Детям для профилактики - 1-2 раза в сутки по 1 таблетке. Дозировка назначается строго индивидуально.

Sulfur-Heel (Сульфур-Хеель)

- 1 таблетка содержит:
- Sulfur Д4 30 мг, Mezereum Д4,
- Acidum arsenicosum Д6 по 15 мг,
- Pix liquida Д6 60 мг,
- Caladium seguinum Д4, Capsicum Д4 по 90 мг.

Sulfur-Heel (Сульфур-Хеель)

- Дерматозы, экземы, зуд кожи и слизистых, прурит.
- Обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день.

Sulfur-Heel (Сульфур-Хеель)

- Sulfur-Heel назначается при экземах, дерматите, дерматозах, дерматомикозах, крапивнице, нейродермите, млечном струпe (наряду с Graphites-Homaccord, Abropernol, Traumeel S - мазь); при детской папулезной крапивнице (наряду с Apis-Homaccord, Psorinoheel, Schwef-Heel), при зуде любой локализации и происхождения (вместе с Mercurius-Heel S, Lamioflur, Galium-Heel, Psorinoheel), при зуде при варикозных экземах (наряду с Cruroheel S, Hamamelis-Homaccord).

Sulfur-Heel (Сульфур-Хеель)

- Данный препарат также назначается для вспомогательной терапии при струпе и аллергических реакциях (вместе с Engystol N, Galium-Heel), при укусах насекомых (Apis-Homaccord).

Sulfur-Heel (Сульфур-Хеель)

- Он показан при поносах по утрам (попеременно с Schwef-Heel, Veratrum-Nomaccord, Diarrheel S), а также дополняет и усиливает действие Schwef-Heel.

Sulfur-Heel (Сульфур-Хеель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 1 таблетке, а для иницирующей терапии при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 1 таблетке под язык в течение 1-2 часов.

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- Активизация защитных систем и функций желез при старческом диабете и связанных с ним расстройствах здоровья.
- Начинают с 10 капель 3 раза в день.

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- Syzygium compositum назначается для вспомогательной терапии при диабете и связанными с ним расстройствами здоровья. При этом необходимо отметить серьезные различия между сенильным диабетом (достаточно безвредным, который можно излечить при помощи диеты) и ювенильным диабетом, который обычно возникает вследствие ретоксического тяжелого поражения ферментных систем (система гипофиза, адреналин, ферменты печени и поджелудочной железы, возможно, и щитовидная железа). При первой форме диабета могут эффективно применяться биологические препараты:

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- 1.) Регуляция посредством диеты, запрета свинины (колбасы из нее, сала, ветчины), по утрам - потребление овсяной каши; из мяса допускается говядина, баранина, птица, рыба; также разрешены яйца, но основу питания должны составлять овощи; необходимо соблюдать дневной рацион калорий.

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- Не употреблять слишком много пищи, при насыщении прекратить есть!
- 2.) Стимуляция функций органов и ферментов биологическими препаратами, катализаторами, суис-органическими препаратами (в небольших дозах, в высоких и средних потенциях для глубокого конституционального воздействия на организм).

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- Попеременно для медикаментозной терапии могут назначаться *Hepar compositum*, *Coenzyme compositum*, *Ubichinon compositum* (для стимуляции ферментных систем), *Thyreoidea compositum*, *Tonsilla compositum* (для стимуляции защитных систем), *Herpeel*, *Chelidonium-Nomaccord*, *Momordica compositum*, *Seanothus-Nomaccord*. Как уже было указано, в анамнезе всех случаев ювенильного диабета лежат токсические и ретоксические поражения (вызванные аллопатическими препаратами, чаще всего, сульфонидами, применяемыми при ангине и прочих реактивных фазах заболеваний).

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- В подобных случаях наблюдаются серьезные нарушения функций регулирующих систем, не только поджелудочной железы и адреналиновой системы, но и центральной гормональной (нейрогормональной) системы (по мнению Клода Бернара, диабет может возникнуть только в тех случаях, когда поражена вегетативная система). В данных случаях необходимы регулярные инъекции инсулина. Но и при ювенильном диабете необходимо регулярно по утрам есть овес, так как он препятствует развитию диабета.

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- При помощи препаратов Syzygium compositum, Galium-Heel, Psorinoheel, Ubichinon compositum, Coenzyme compositum, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum, Traumeel S, Engystol N, Нереел, Lymphomyosot и суис-органных препаратов нужно попытаться вызвать регрессивную викариацию: инфекционные заболевания, тонзиллярную ангину, грипп и т.п., чтобы излечить фазу дегенерации.

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- Практически любое острое или хроническое заболевание реактивной фазы у диабетиков (например, нагноения фистул, образование экзем, кожные заболевания, грипп, ангина) является попыткой организма вывести гомотоксины. Подобные реактивные фазы ни в коем случае не должны подавляться, так как подавление может вызвать резкий переход фазы дегенерации в диабетическую кому.

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- Как показывают практика и эксперименты, встречающийся часто и обусловленный наследственностью сенильный диабет представляет собой вызванный гомотоксинами целесообразный защитный процесс организма от избытков продуктов питания (особенно свинины), при котором эти продукты выводятся из организма посредством промежуточного вещества - глюкозы, которая может легко транспортироваться в организме.

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- С этой точки зрения становится понятно, почему диета оказывает такое воздействие; при ней необходимо употреблять в пищу больше углеводов (в первую очередь, овощей) и исключить из рациона вещества и продукты (особенно свинину), содержащие токсины и калории и вызывающие диабет. При доброкачественных формах диабета часто наблюдается склонность к атеросклерозу; для терапии в этом случае назначаются препараты Syzygium compositum, Cralonin, Melilotus-Homaccord N, Aurumheel N, Rauwolfia compositum (при гипертонии).

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- При нарушениях периферического кровоснабжения и образовании гангренов у диабетиков назначаются Placenta compositum, Circulo-Injeel, Natrium pyruvicum-Injeel.

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- С точки зрения гомотоксикологии, диабет является комплексным заболеванием, защитным процессом против токсинов, а не локальным расстройством деятельности поджелудочной железы.

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- Из этого вытекает необходимость правильной терапии, в первую очередь, правильного питания (отказа от свинины), активации функций печени и соединительной ткани. Именно этим целям и служит препарат *Syzygium compositum*, показанный для длительной терапии диабета.

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- Дополнительно при сахарном диабете назначаются Coenzyme compositum, Circulo-Injeel (при диабетических гангренах), Natrium pyruvicum-Injeel (3 раза в неделю по 1 ампуле).

Syzygium compositum (Сицигиум КОМПОЗИТУМ)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 2-4 раза в сутки по 10 капель, а в начале курса терапии (около 5 дней) - 6 раз в сутки по 10 капель.