

Тип - членистоногие

Класс - Насекомые

Отряд - Клопы

1. Брюшко клоп имеет плоское или овальное, которое при насыщении кровью приобретает красноватый оттенок.
2. Паразит имеет три пары лапок.
3. Голова паразита имеет небольшой размер, как у самок, так и у самцов. На голове спереди имеется характерный хоботок, которым он пронзает кожные покровы и питается кровью.
4. Стандартный клоп имеет размер в 6-8 мм, но зачастую при интенсивном питании они могут вырастать до 10 мм.




Рис. 220. Наружное строение клопа:

А — со спинной стороны; **Б** — с брюшной стороны;
1 — усик; **2** — сложный глаз; **3** — темя; **4** — простой
 глазок; **5** — хоботок; **6** — переднеспинка; **7** — передне-
 грудь; **8** — среднегрудь; **9** — щиток; **10** — плотная
 часть надкрылья; **11** — перепончатая часть надкрылья;
12 — заднегрудь; **13** — отверстия пахучих желез; **14** —
 дыхальца; **I — VI** — сегменты брюшка.

Постельный клоп



- ▶ Вид клопов, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных - питается их кровью.



Лесной клоп

- ▶ Каждый год с началом тепла лесные клопы начинают досаждают огородникам, атакуя посадки. Как и щитник зеленый, лесной клоп обладает резким неприятным запахом, а также довольно неприятным внешним видом. Окраска бывает не только зеленой, но и бурой. Это очень опасный огородный вредитель, так как от него страдают практически любые посадки: фрукты, овощи, ягоды. Паразиты откладывают яйца прямо на культурах, надежно закрепляя их на поверхности растений. Появившиеся из яиц личинки тут же принимаются за уничтожение растения, на котором они появились. Это губительно сказывается на культурах.



Клоп-солдатик

- ▶ Этот вид насекомых известен многим с самого детства. Все благодаря приметному внешнему виду. Контрастная красно-черная окраска делает его похожим на божью коровку и неизменно привлекает внимание. Причем эти насекомые совсем не стремятся прятаться. Обитают они в дикой природе, начиная показываться с первым весенним теплом. Их в большом количестве можно наблюдать на солнечной стороне пней, деревьев, заборов. Вред, причиняемый людям этими вредителями, не прямой, а косвенный. Солдатики существенно мешают нормальному развитию садовых посадок: они поедают молодые листья растений и садовые посадки. Кроме того, насекомые питают слабость к мякоти фруктов. Например, ягоды винограда довольно часто оказываются высосанными солдатиками.