

Снижение риска падений в больнице

Шмелёв Д.А.
171 группа 2 бригада

**Главный способ
профилактики падения для
пациента является**

**Остаться в

постели!**



Когда вам следует поговорить с медсестрой о планах предотвращения падений и ежедневной мобильности?

- Когда вас госпитализируют, вы и ваша медсестра поговорите о вашем риске
- Расскажите медсестре о ваших предыдущих инцидентах
- В случае инцидента вы должны повторно поговорить о профилактике падения с мед персоналом

Эксперимент



Общее количество пациентов в эксперименте 1132.

Все старше 75 лет.



Ключевые моменты

- Падения среди стационарных пациентов больниц - это наиболее частый инцидент, связанный с безопасностью в больницах.
- Не все падения можно предотвратить, но и они не являются неизбежными: 20–30% падений можно предотвратить, оценив риски и приняв меры для их снижения.
- Доступные инструменты для проверки риска падений слишком малочувствительны, чтобы быть полезными для предотвращения падений в стационаре.
- Мы должны поощрять культуру бдительного осознания безопасности посредством постоянной обратной связи и извлечения уроков из неблагоприятных событий.
- Предотвращение падений в больнице - дело каждого; врачи всех уровней и дисциплин должны сыграть важную роль в предотвращении вреда, причиненного падением в стационаре.



САҢТЫ

PDF

