

Виды индивидуальных аптечек



Аптечка Индивидуальная-1 (АИ-1)

- **(АИ-1)** — предназначена для профилактики шока при ранениях, тяжелых травмах и первой медпомощи при радиационном, химическом и бактериальном поражениях, а также при их комбинациях с травмами.


Комплектация индивидуальной аптечки АИ-1

<u>Секция</u>	<u>Лекарственный препарат</u>	<u>Используется при симптомах</u>
<u>1</u>	«Тарен»	Отравление фосфорорганическими веществами.
<u>2</u>	Шприц-тюбик-«Промедол»	Обширные ожоги или переломы костей.
<u>3</u>	Таблетки «Цистамин»	Поражение ионизирующим излучением.
<u>4</u>	«Вибромицин»	Инфекционные заболевания после радиоактивного облучения.
<u>5</u>	«Йодистый калий»	Попадание в организм радиоактивного йода.
<u>6</u>	«Этаперазин»	Облучение.
<u>7</u>	«Перфеназин»	Рвота.



Для использования шприц-тюбика необходимо

- извлечь шприц-тюбик из аптечки;
- одной рукой взяться за ребристый ободок канюли, другой - за корпус и повернуть корпус по ходу часовой стрелки до упора - для прокола мембраны;
- взять шприц-тюбик за канюлю, снять колпачок, защищающий иглу;
- удерживая шприц-тюбик за ребристый ободок канюли и не сжимая пальцами тюбика, ввести иглу в мягкие ткани бедра, ягодицы или плеча (можно через одежду) до канюли;
- выдавить содержимое тюбика, сжимая его корпус;
- не разжимая пальцев, извлечь иглу.



Аптечка индивидуальная (АИ-2)


(АИ-2) - предназначена для оснащения каждого работника всех объектов экономики РФ вне зависимости от формы собственности. Аптечка АИ-2 входит в обязательный табель оснащения нештатных аварийно спасательных формирований (НАСФ), входящих в состав сил и средств, Гражданской обороны и Гражданской защиты особоопасных предприятий, имеющих важное оборонное и экономическое значение.

Комплектация индивидуальной аптечки АИ-2

<u>Секция</u>	<u>Лекарственный препарат</u>	<u>Используется при симптомах</u>
<u>1</u>	Шприц-тюбик-«Промедол»	Обширные ожоги или переломы костей.
<u>2</u>	«Афин»	Отравление.
<u>3</u>	«Сульфадиметоксин»	Кишечно-желудочное расстройство.
<u>4</u>	Таблетки «Цистамин»	Поражение ионизирующим излучением.
<u>5</u>	Хлортетрациклин	При бактериальном заражении, а также при ранах и ожогах.
<u>6</u>	«Йодистый калий»	Попадание в организм радиоактивного йода.
<u>7</u>	«Перфеназин»	Рвота.

АПТЕЧКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АИ-2

Содержит медицинские средства защиты и предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения или ослабления поражения радиоактивными, отравляющими или аварийно химически опасными веществами (АХОВ), а также для предупреждения заболевания инфекционными болезнями



Аптечка индивидуальная (АИ-3)

(АИ-3)-комплексное средство оказания неотложной помощи в порядке само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах в боевых условиях. Рассчитана на оказание помощи 1 человеку. Поставляется в капроновой сумке-укладке хаки или камуфлированной окраски. Универсальное крепление позволяет размещать его на любом типе спецодежды.

Комплектация индивидуальной аптечки (АИ-3)

- 1) **Жгут кровоостанавливающий** (1шт.) Для остановки артериального кровотечения
- 2) **Пакет перевязочный** (1шт.) Для остановки кровотечений, закрытия ран
- 3) **Пакет перевязочный ППИ АВ-3** (1шт.) Для остановки кровотечений, закрытия ран
- 4) **Лейкопластырь бактерицидный 4x10** (3шт.) Для лечения мелких ран, порезов
- 5) **Салфетки Гигиенические** (3шт.) Антисептическое средство
- 6) **Сульфацил натрия 20 % 1.5 мл., капли** (2шт.) При травмах, инфекционных заболеваниях глаз, конъюнктивитах.
- 7) **Бинт стер. 5x10** (1шт.) Для фиксации салфеток на ране
- 8) **Парацетамол таб. №10 (Анальгин)** (1шт.) Обезболивающее, жаропонижающее средство.

Комплектация индивидуальной аптечки (АИ-3)

- 9) **Фталазол таб. 0.5 №10** (1шт.) При желудочно-кишечных инфекциях.
- 10) **Салфетка Фармитекс ДЛРА №3** (1шт.) Для лечения ожоговых ран и ран с выраженным болевым синдромом.
- 11) **Доксициклина гидрохлорид капс. 0.1 №10** (1шт.) Антибиотик, применяется при инфекциях различной локализации.
- 12) **Акватабс таб. №10** (1шт.) Для обеззараживания воды из открытых источников.
- 13) **Гель противовоспалительный** (1шт.) Для лечения ожогов, ран, потертостей и пр.
- 14) **Футляр под шприц-тюбики** (1шт.).
- 15) **Состав – описание** (1шт.)
- 16) **Футляр-подсумок с защ. капюшоном** (1шт.) Для переноски и хранения медимущества.

Аптечка индивидуальная АИ-3

Предназначена для оснащения бойцов, участвующих в боевых действиях в составе основных сил, обеспечения служб ГО РФ и внутренних войск, сотрудников спецподразделений, занимающихся проведением оперативных мероприятий, сотрудников личной охраны, инкассаторской и фельдъегерской служб, спасательных подразделений и охранных структур, сотрудников профессий высокой степени риска; Блокпост - предназначен для оснащения стационарных постов охраны, блокпостов, таможенных пунктов, контрольных пунктов милиции, постов ДПС, а также для оснащения автомобилей групп быстрого реагирования.



В **холодное время** года аптечку рекомендуется носить в нагрудном кармане обмундирования для предупреждения замерзания жидких лекарственных средств.

Лекарственные средства, содержащиеся в аптечке, применяют в зависимости от показаний как **по указанию командира** (старшего), так и **самостоятельно** в соответствии с инструкциями.

Самостоятельно при наличии показаний применяют следующие лекарственные средства: средство при отравлении ФОВ - при первых признаках поражения; противоболевое средство - при травмах и ожогах, сопровождающихся сильными болями; противобактериальное средство - при ранениях и ожогах; противорвотное средство - при появлении тошноты, вызванной воздействием ионизирующих излучений, а также контузиями и другими факторами.

Только по команде (указанию) командира применяют: радиозащитное средство; противобактериальное средство - при опасности заражения возбудителями инфекционных заболеваний; профилактическое средство от отравления ФОВ (таблетки) - в предвидении внезапного применения химического оружия противником; противорвотное средство - в предвидении воздействия радиации в больших дозах.

Установленные дозировки лекарственных средств необходимо строго соблюдать во избежание снижения их эффективности или проявления отрицательного воздействия на организм.

Спасибо за внимание!

