


СПИД – не случайность!



Почему мы говорим о ВИЧ/СПИД

- ❖ **Вакцины нет, поэтому профилактика – единственное средство сдерживания эпидемии;**
- ❖ **Наибольшей опасности подвергается молодежь – именно ей свойственны активность и рискованное поведение.**

Опрос 500 первокурсников профессиональных училищ, лицеев и колледжей показал:

- **69% 16-17-летних уже жили половой жизнью;**
- **Более 60% из них начали половую жизнь в 14-15 лет;**
- **Каждый четвертый юноша и каждая десятая девушка имели 6 и более партнеров;**
- **82% студентов регулярно употребляют алкоголь, а 40% курили марихуану;**
- **Треть употребляла алкоголь или наркотики перед последним половым актом;**
- **Треть не использовала презерватив во время последнего полового акта.**


Утверждения

№		Правда	Ложь
1	В мире известны случаи заражения ВИЧ от укуса насекомых.		
2	Если съесть хлеб, на который попала кровь ВИЧ - инфицированного, можно заразиться.		
3	ВИЧ может распространяться воздушно – капельным путем.		
4	Презерватив не является гарантией от ВИЧ – инфекции.		
5	Если жить в одной квартире с ВИЧ – инфицированным, заразишься обязательно.		
6	Чтобы не заразиться ВИЧ, достаточно промыть медицинские инструменты холодной водой.		
7	Современная медицина может вылечить от ВИЧ.		
8	Это неправда, что СПИД смертельное заболевание.		
9	ВИЧ – инфицированных можно узнать по внешним признакам.		
10	ВИЧ можно заразиться, если вводить наркотики одним шприцем с другими людьми.		

● В – вирус

● И – иммунодефицита

● Ч – человека





● С – синдром

● П – приобретенного

● И – иммунного

● Д – дефицита



ВИЧ - коварен

- Его долго не могли обнаружить, так как зараженные им люди умирали от обычных болезней, что не вызывало подозрений.
- Находясь в организме, вирус ничем себя не выдает продолжительное время. Человек думает, что он здоров, но при этом заражает других.

Каковы же симптомы заболевания?

- Почти сразу после попадания ВИЧ в организм у инфицированного человека возникает состояние, напоминающее грипп, которое быстро проходит.
- Постепенно иммунная система ослабевает.
- Лимфатические узлы сильно увеличиваются.
- У больного развиваются многочисленные заболевания: пневмония, рак, различные инфекционные заболевания.
- Больной резко теряет в весе (10% и более),
- Месяцами страдает от высокой температуры, сильного ночного потоотделения, хронической усталости, постоянного кашля, расстройства кишечника.
- Эта последняя стадия заболевания называется СПИД.
- Сопrotивляемость организма окончательно утрачивается, а многочисленные болезни настолько обостряются, что больной умирает.

ВИЧ передается:

При половых контактах.

При переливании крови.

При использовании нестерильных медицинских инструментов.

При родах от матери ребенку (при прохождении через родовые пути).

При кормлении грудью.

ВИЧ не передается:

Через укусы животных и насекомых.

В общественном транспорте, бассейне.

При поцелуях, кашле, чихании, рукопожатии,


При использовании общей посуды, ванны, унитаза.

Через пот, слезы.

Пандемия Вич/СПИДа – проблема XXI века

- Для ВИЧ – инфекции не существует таких границ и преград как расовая принадлежность, национальность, возраст, пол, сексуальная ориентация,
- заражению подвержены мужчины и женщины,
- дети и старики.
- заражаются как в развитых, так и в развивающихся странах,
- проживающие в городах и сельской местности,
- богатые и бедные.

Заболееваемость СПИДом



Ситуация 1

- Катя встречается с парнем, который раньше несколько раз пробовал наркотики (кололся). Теперь он этого не делает и чувствует себя хорошо. Она хочет выйти за него замуж и беспокоится, есть ли у нее риск заразиться ВИЧ.
- **Есть ли у девушки риск заразиться ВИЧ?**
- **Что можно посоветовать девушке и ее парню?**

Тест на ВИЧ

- **Выявляет антитела к ВИЧ через 3-6 месяцев после заражения**
- **С момента заражения и до 3-6 месяцев – период серонегативного окна – человек заражен, но анализ этого не показывает**

Популярные вопросы:

- *Что означает отрицательный результат?*
- *Если результат положительный?*
- *Причины, почему необходимо сделать тест на ВИЧ?*
- *Когда необходимо пройти тест на ВИЧ?*
- *Где можно сдать тест на ВИЧ?*

Ситуация 2

- Маша давно мечтала о сережках. В день рождения ей подарили хорошенькие сережки, но у нее не были проколоты уши: мама не давала денег на косметический салон. Подруга посоветовала пойти к соседке, которая прокалывала уши дома и брала недорого. Когда Маша пришла к этой женщине, там уже ждали своей очереди две девушки. Маша обратила внимание на то, что машинка для прокалывания ушей не стерилизовалась после использования.
- **Есть ли у Маши риск заражения ВИЧ?**
- **Что следует сделать Маше?**

1. Сдавая анализ крови из вены в поликлинике, следует:

- А) проследить за тем, чтобы шприц и игла были _____
- Б) обратить внимание, чтобы на руках у медицинского работника были новые _____
- В) принести с собой _____
- Г) при возникновении сомнений в стерильности инструментов сказать _____

2. В косметическом салоне, делая маникюр, педикюр, татуировку, пирсинг, следует:

- А) спросить у специалиста _____
- Б) принести свои _____
- В) заметив, что после предыдущего клиента инструменты не стерилизовались, потребовать _____

3. При оказании первой медицинской помощи потерпевшему с открытой раной и без сознания следует:

- А) избегать прямого контакта с _____**
- Б) при остановке крови пользоваться _____, а затем _____**

№	Действия или поступки	Опасно (ДА/НЕТ)
1	Поцелуи	
2	Переливание крови	
3	Объятия	
4	Оказание первой медицинской помощи	
5	Половые контакты без презерватива	
6	Чихание, кашель	
7	Езда в общественном транспорте	
8	Укусы насекомых	
9	Использование чужих игл, шприцев	
10	Плавание в бассейне	
11	Совместное использование книг	
12	Массаж	
13	Использование постельных принадлежностей	

№	Действия или поступки	Опасно (ДА/НЕТ)
14	Воздержание от половых контактов	
15	Роды	
16	Татуировка	
17	Прокалывание ушей	
18	Использование чужого стакана	
19	Использование стерильных инструментов для инъекций	
20	Сдача донорской крови	
21	Обучение в одной школе с ВИЧ – инфицированным ребенком	
22	Половые контакты с презервативом	
23	Использование чужой зубной щетки	
24	Внутривенное введение наркотиков	
25	Совместное использование опасной бритвы	

Утверждения

№		Правда	Ложь
1	В мире известны случаи заражения ВИЧ от укуса насекомых.		
2	Если съесть хлеб, на который попала кровь ВИЧ - инфицированного, можно заразиться.		
3	ВИЧ может распространяться воздушно – капельным путем.		
4	Презерватив не является гарантией от ВИЧ – инфекции.		
5	Если жить в одной квартире с ВИЧ – инфицированным, заразишься обязательно.		
6	Чтобы не заразиться ВИЧ, достаточно промыть медицинские инструменты холодной водой.		
7	Современная медицина может вылечить от ВИЧ.		
8	Это неправда, что СПИД смертельное заболевание.		
9	ВИЧ – инфицированных можно узнать по внешним признакам.		
10	ВИЧ можно заразиться, если вводить наркотики одним шприцем с другими людьми.		

СПИД – это не случайность, это результат твоего поведения.

- **Стремясь показаться взрослым, мы совершаем асоциальные поступки (пробуем курить, принимать алкоголь и наркотики, вступаем в случайные половые связи).**
- **Помни: Взрослость – это не распущенность.**
- **Взрослость – это ответственность за свои поступки!**

Презерватив – это

не

100 %-ная

защита от СПИДа!

Главная защита –

твоя умная

голова!

