

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ БИО-МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ

СЕРИЯ 8



Методы анализа выживаемости. Кривые Каплана-Майера. Сох-регрессия

Анализ данных выживаемости

- Статистические методы анализа продолжительных (во времени) данных, отражающих **наступление событий**
- К событиям относятся: смерть, травма, наступление заболевания, выздоровление (**бинарные показатели**), или переход через **пороговое значение** какой-либо интервальной переменной (например, снижение уровня лейкоцитов ниже нормы)
- Включает данные **рандомизированных контролируемых исследований** или исследований **когортного дизайна**

Зачем нужен анализ данных выживаемости?


- Почему нельзя сравнить время до наступления события в группах при помощи t-теста или линейной регрессии?
 - Если нет цензурирования, то так сделать можно, в противном случае – данные отсутствуют
- Почему нельзя сравнить частоты событий в группах при помощи риска/отношений шансов или логистической регрессии?
 - Такой подход игнорирует время до наступления события




- **Выживаемость:** вероятность прожить более n времени с момента события
- **Время до наступления события:** время с момента включения в исследование до наступления заранее оговоренного (и точно определенного) исхода
- **Цензурирование:** вариант развития событий, когда пациенты выбывают или исключаются из исследования до наступления интересующего исхода. В этом случае пациенты считаются живыми или с ненаступившим целевым исходом на момент последнего контакта

Кривые Каплана-Мейера


- Непараметрическая оценка функции выживания
 - Эмпирическая вероятность выжить после определенного времени (с учетом цензурирования)
 - Обычно используется для сравнения двух исследуемых популяций
 - Интуитивное графическое представление



Данные выживаемости



Соответствующая кривая Каплана-Мейера



Из теории вероятностей:

$P(A \& B) = P(A) * P(B)$ если A и B независимы

В анализе выживаемости: интервалы определяются наступлением событий (2 интервала, заканчивающиеся наступлением событий).

$P(\text{выжить в течение периодов 1 и 2}) = P(\text{выжить в течение периода 1}) * P(\text{выжить в течение периода 2})$

$= 4/5 * 2/3 = .5333$

Кривые Каплана-Мейера

Ограничения:

- Оценки выживаемости могут быть **ненадежны** в **конце исследования**, когда остается малое количество пациентов с риском развития исхода
- Отсутствует контроль **ковариат**
- Требует для проведения сравнения **качественных** предикторов (независимых факторов)
- Не может включать предикторные (независимые) переменные, **изменяющиеся со временем**

Сох-регрессия

- Аналогична логистической регрессии
- Работает с факторами и ковариатами
- Есть варианты метода работающие с изменяющимися во времени переменными
- **Обладает меньшей мощностью и сложнее в трактовке**



- Reports ▸
- Descriptive Statistics ▸
- Custom Tables ▸
- Compare Means ▸
- General Linear Model ▸
- Generalized Linear Models ▸
- Mixed Models ▸
- Correlate ▸
- Regression ▸
- Loglinear ▸
- Neural Networks ▸
- Classify ▸
- Dimension Reduction ▸
- Scale ▸
- Nonparametric Tests ▸
- Forecasting ▸
- Survival ▸**
 - Life Tables...
 - Kaplan-Meier...
 - Cox Regression...
 - Cox w/ Time-Dep Cov...
 - Parametric Regression
 - Cox Regression Extension
- Multiple Response ▸
- Missing Value Analysis...
- Multiple Imputation ▸
- Complex Samples ▸
- Simulation...
- Quality Control ▸
- ROC Curve...
- Ranfor Prediction
- RanFor Estimation...
- Spatial and Temporal Modeling... ▸
- Linear Programming

Visible: 4 of 4 Variables

	RatID	FatLevel
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	4	1
5	5	1
6	6	1
7	7	1
8	8	1
9	9	1
10	10	1
11	11	1
12	12	1
13	13	1
14	14	1
15	15	1
16	16	1
17	17	1
18	18	1
19	19	1
20	20	1
21	21	1
22	22	1
23	23	1

var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var



Visible: 4 of 4 Variables

	RatID	FatLevel	TumorFreeTime	Censored	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
1	1	1	140,00	0											
2	2	1	177,00												
3	3	1	50,00												
4	4	1	65,00												
5	5	1	86,00												
6	6	1	153,00												
7	7	1	181,00												
8	8	1	191,00												
9	9	1	77,00												
10	10	1	84,00												
11	11	1	87,00												
12	12	1	56,00												
13	13	1	66,00												
14	14	1	73,00												
15	15	1	119,00												
16	16	1	140,00												
17	17	1	200,00												
18	18	1	200,00												
19	19	1	200,00												
20	20	1	200,00	1											
21	21	1	200,00	1											
22	22	1	200,00	1											
23	23	1	200,00	1											

Life Tables

Time: TumorFreeTime

Display Time Intervals: 0 through 200 by 10

Status: Censored(0)

Factor: FatLevel(1 3)

By Factor:

Buttons: OK, Paste, Reset, Cancel, Help

Life Tables: Options

Life table(s)


Plot:

- Survival
- Hazard
- One minus survival
- Log survival
- Density

Compare Levels of First Factor:

- None
- Overall
- Pairwise

Buttons: Continue, Cancel, Help



	RatID	FatLevel	TumorFreeTime	Censored	var
1	1	1	140,00	0	
2	2	1	177,00	0	
3	3	1	50,00	0	
4	4	1	65,00	0	
5	5	1	86,00	0	
6	6	1	153,00	0	
7	7	1	181,00	0	
8	8	1	191,00	0	
9	9	1	77,00	0	
10	10	1	84,00	0	
11	11	1	87,00	0	
12	12	1	56,00	0	
13	13	1	66,00	0	
14	14	1	73,00	0	
15	15	1	119,00	0	
16	16	1	140,00	1	
17	17	1	200,00	1	
18	18	1	200,00	1	
19	19	1	200,00	1	
20	20	1	200,00	1	
21	21	1	200,00	1	
22	22	1	200,00	1	
23	23	1	200,00	1	

Kaplan-Meier: Compare Factor Levels

Test Statistics

Log rank Breslow Tarone-Ware

Linear trend for factor levels

Pooled over strata Pairwise over strata

For each stratum Pairwise for each stratum

Continue Cancel Help

Kaplan-Meier

Time: TumorFreeTime Compare Factor...

Status: Censored(0) Save...

Define Event...

Factor: FatLevel

Strata:

Label Cases by: RatID Options...

OK Paste Reset Cancel Help



Visible: 4 of 4 Variables

	RatID	FatLevel	TumorFreeTime	Censored	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
1	1	1	140,00	0											
2	2	1	177,00	0											
3	3	1	50,00	0											
4	4	1	65,00	0											
5	5	1	86,00	0											
6	6	1	153,00												
7	7	1	181,00												
8	8	1	191,00												
9	9	1	77,00												
10	10	1	84,00												
11	11	1	87,00												
12	12	1	56,00												
13	13	1	66,00												
14	14	1	73,00												
15	15	1	119,00												
16	16	1	140,00												
17	17	1	200,00												
18	18	1	200,00												
19	19	1	200,00												
20	20	1	200,00	1											
21	21	1	200,00	1											
22	22	1	200,00	1											
23	23	1	200,00	1											

Kaplan-Meier

Kaplan-Meier: Options

Statistics

- Survival table(s)
- Mean and median survival
- Quartiles

Plots

- Survival
- One minus survival
- Hazard
- Log Survival

Time: TumorFreeTime Compare Factor...

Status: Censored(0) Save...

Options...

Factor: FatLevel

Strata:

Label Cases by: RatID

OK Paste Reset Cancel Help



	RatID	FatLev
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	

5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	20	1	200,00	1
21	21	1	200,00	1
22	22	1	200,00	1
23	23	1	200,00	1

RatID
FatLevel

Time: TumorFreeTime

Status: Censored(0)

Define Event...

Block 1 of 1

Previous Next

Covariates:
FatLevel(Cat)

Method: Enter

Strata:

OK Paste Reset Cancel Help

Categorical...

Plots...

Save...

Options...

Bootstrap...

Cox Regression: Define Categorical Covariates

Covariates:

Categorical Covariates:
FatLevel(Indicator)

Change Contrast
Contrast: Indicator Change

Reference Category: Last First

Continue Cancel Help

Cox Regression

RatID
FatLevel

RatID	FatLev
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23

Time: TumorFreeTime

Status: Censored(0)

Define Event...

Block 1 of 1

Previous Next

Covariates: FatLevel(Cat)

>a*b>

Method: Enter

Strata:

OK Paste Reset Cancel Help

Categorical...
Plots...
Save...
Options...
Bootstrap...

Cox Regression: Plots

Plot Type

Survival Hazard Log minus log

One minus survival

Covariate Values Plotted at:


Separate Lines for:
FatLevel (Cat) (Mean)

Change Value

Mean Value: []

Change

Continue Cancel Help



Cox Regression

Time: TumorFreeTime

Status: Censored(0)

Define Event...

Block 1 of 1

Previous Next

Covariates: FatLevel(Cat)

>a*b>

Categorical...
Plots...
Save...
Options...
Bootstrap...

Cox Regression: Options

CI for exp(B) 95 %

Correlation of estimates

Display model information

At each step
 At last step

Probability for Stepwise
Entry: .05 Removal: .10

Maximum Iterations: 20

Display baseline function

Continue Cancel Help

Лирическое отступление

Доказательная медицина

- Несмотря на проблемы, доказательная медицина остается «золотым стандартом»
- С одной стороны: возможность искать причины заболеваний без глубокого понимания механизмов
- С другой стороны: упор на экстенсивное изучение факторов, предикторов и сравнение групп в ущерб изучению физиологии приводит к тому, что увеличивается количество данных, но не смысла

Доказательная медицина и причинно-следственные механизмы

- Все больше внимания к статистическим результатам, часто некритичного
- Предположение, что механизм *может* существовать достаточно, чтобы результаты исследования были некритически приняты
- Свидетельство того, что вмешательство работает – не говорит о том, что оно работает именно по этому механизму
- Отсутствие знания патофизиологических механизмов может тормозить разработку более эффективных методов вмешательства

Спасибо за внимание!

