





Психопатология

Практика 3

Выполнила студентка РГПУ Им. Герцена,
ИДОиР, 2 курса, 2-лого группы,
Сорокина Маргарита Андреевна


Психопатологическая семиотика

- Семиотика (в медицине) — учение о признаках болезней (симптомах) и характерных их сочетаниях (синдромах). Семиотику психических расстройств обычно называют **общей (описательной) психопатологией**
- **Симптом** — отдельный признак болезни, выраженный субъективными жалобами пациента (объективные признаки болезни, например отклонение лабораторного показателя, лучше обозначать термином «признак»).
- **Синдром** (от греч. syn — совместный; drome — бег; «совместный бег симптомов») — совокупность симптомов, объединенных общим механизмом развития (патогенезом), устойчиво наблюдающихся вместе и имеющих закономерные взаимосвязи. В отличие от синдрома, симптомокомплекс — это сумма всех симптомов, выявляемых у пациента на момент исследования, в том числе тех, которые могут быть не связаны общим патогенезом.





Психопатологическая синдромология

- Важное место в общей психопатологии занимают понятия продуктивных и негативных расстройств. Продуктивной (позитивной) симптоматикой называют новый феномен, появившийся в результате болезни, отсутствующий у здоровых людей.
- Примерами позитивной симптоматики служат бред и галлюцинации, навязчивые идеи, чувство тоски при депрессии.



Психопатологическая синдромология

- Негативной (дефицитарной) симптоматикой, напротив, именуют ущерб, который наносит болезнь естественным здоровым функциям организма, т. е. ослабление или исчезновение какой-либо способности. Примерами негативной симптоматики являются утрата памяти (амнезия), интеллекта (слабоумие), неспособность испытывать эмоции и чувства (апатия).




- При одном и том же заболевании в разные периоды времени наблюдаются различные синдромы, а один и тот же синдром может наблюдаться при разных заболеваниях. Выделяют 6 уровней психопатологических синдромов.
- 1. Невротические синдромы. – астенический; – обсессивный; – истерический.
- 2. Аффективные синдромы: – депрессивный; – маниакальный.
- 3. Бредовые и галлюцинаторные синдромы: – паранойяльный; – параноидный; – синдром психического автоматизма (Кандинского–Клерамбо); – парафренный; – галлюцинозы.
- 4. Синдромы с преобладанием волевых расстройств: – кататонический; – гебефренический; – апато-абулический.
- 5. Синдромы нарушенного сознания: – делириозный; – онейроидный; – аментивный; – сумеречное помрачение сознания.
- 6. Органические синдромы: – психоорганический; – корсаковский (амнестический) синдром; – деменции.




Эпилепсия

- **Эпилепсия** — это хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся повторными спонтанными приступами (пароксизмами), которые возникают в результате избыточных нейронных разрядов. Клинически эпилепсия проявляется судорогами и изменениями сознания (вплоть до его потери) Эпилепсия может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом другой патологии.

Тоническая фаза



Клоническая фаза



Первая помощь при эпилепсии

- Удалите все предметы, находящиеся в непосредственной близости от больного, которые могут нанести вред ему во время эпилептического приступа (утюг, стекло и пр.).
- Подложите под голову мягкий, плоский предмет (подушку, сумку, пакет).
- Расстегните одежду или развяжите галстук, можно также ослабить поясной ремень.
- Вплоть до прекращения судорог переведите человека в боковое положение (зафиксируйте ноги распрямленными, а руки лежащими вдоль тела).
- Не кладите никаких предметов в рот (шпатель, ложка и т.д.), а также не предпринимайте попыток разжать челюсти пациента.
- Не заливайте в рот никакой жидкости до тех пор, пока больной полностью не придет в сознание.
- Не рекомендуется удерживать больных во время эпилептического приступа.
- Если приступ случился с незнакомым человеком, поищите в его вещах документы, подтверждающие возможное заболевание или идентификационный браслет.
- Зафиксируйте время начала эпилептического приступа, чтобы установить его продолжительность.
- Всегда ждите на месте происшествия, пока пациент не придет в сознание.
- Если это необходимо, вызовите скорую медицинскую помощь.



ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ


Первая помощь при приступе эпилепсии




МЯГКОЕ ПОД ГОЛОВУ



РАЗВЯЖИТЕ ГАЛСТУК



НАКЛОНИТЕ НА БОК



**ЗАФИКСИРУЙТЕ
ВРЕМЯ ПРИПАДКА**



**В РОТ НИЧЕГО НЕ
ВСТАВЛЯТЬ**



НЕ ДАВИТЬ



ПОСЛЕ ПРИСТУПА ...



**... ПРЕДЛОЖИТЬ
ПОМОЩЬ**

Спасибо за внимание

