


«Острый живот»

- Острый живот — клинический симптомокомплекс, развивающийся при повреждениях острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
- Не является окончательным диагнозом. Этот термин используют, когда не удаётся установить точный диагноз острого хирургического заболевания, а ситуация требует срочной госпитализации.


СИМПТОМ

- внезапное появление постоянной или схваткообразной боли, локализованной или распространенной по всему животу. Боль может быть резко выраженной и сопровождаться развитием шока.
 - тошнота и рвота, которые могут возникнуть в первые часы и даже минуты заболевания.
 - Задержка стула и прекращение отхождения кишечных газов.
 - Повышение температуры тела, озноб, воспалительные изменения в анализе крови.
 - симптомов раздражения брюшины (Щеткина-Блюмберга, Раздольского, Воскресенского и др.)
- 


Симптом Щеткина-Блюмберга

- резкое усиление боли в животе при быстром снятии пальпирующей руки с передней брюшной стенки после надавливания.

Симптом раздражения брюшины, в большинстве случаев – признак воспалительного процесса, в который вовлечена брюшина: перитонит, перитонизм и прочие.




Симптом Воскресенского - врач, располагаясь справа от больного, левой рукой натягивает его рубашку, а правой производит по ней скольжение кончиками пальцев от подложечной области по направлению к правой подвздошной. В конце скольжения больной ощущает резкую боль (симптом считается положительным).



Симптом Раздольского (у 93% больных)

при перкуссии брюшной стенки боль в правой подвздошной области усиливается или появляется, если в момент осмотра больного она им не ощущается.



Р и с. 7. Симптом Раздольского

**Наиболее
важным
синдромом
является:**

**Боль
повышенной интенсивности.
Любое движение, чихание или
кашель
усугубляют чувство болезненнос
ти. Пациент
принимает статичную
позу, подтянув к животу колени.**

Локализация боли прослеживается только в начале приступа. Затем же она распространяется на всю брюшину. Источник боли определяют с помощью постукиваний пальцами по животу. Место наибольшей концентрации боли соответствует пораженному органу.



Если болит живот


пупочная грыжа,
грыжа белой линии
живота

гепатит,
холецистит,
плеврит,
нижнедолевая
пневмония

гастрит,
гастродуоденит

КОЛИТ

апендицит, сальпингит,
оофорит, спайки,
энтероколит



панкреатит,
сплетит,
болезнь Вакеза,
плеврит,
нижнедолевая
пневмония

КОЛИТ

сальпингит,
оофорит, спайки,
энтероколит

эндометрит, боли
при
месячных, цистит

Неотложная помощь при остром животе:

Вызвать скорую помощь.

Уложить пациента.

Приложить холод к животу.

Не давать есть, пить, принимать анальгетики, антибиотики. При сильной жажде смочить губы или полоскать рот.

Запрещается употребление слабительных, постановка клизм.

