




Biologische Heilmittel Heel GmbH i - m

Ignatia-Homaccord (Игнация-Гомаккорд)

- Капли: 100 г содержат:
- Ignatia Д4, Д10, Д30, Д200,
- Moshchus Д6, Д30, Д200 по 0,5 г. Содержит алкоголя 35% объемных.
- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- Ignatia Д6, Д10, Д30, Д200, Д8, Д30,
- Moshchus Д6, Д30, Д200 Д200 по 0,5 мкл.



Ignatia-Номасскорд **(Игнация-Гомаккорд)**

- Депрессия, особенно экзогенного происхождения; парадоксальные симптомы, истерическая афония.

Ignatia-Homaccord (Игнация-Гомаккорд)

- Капли: обычно 10 капель 3 раза в день, при конвульсиях начинают с 10 капель каждые 15 минут. Длительная терапия допускается только с разрешения врача.
- Раствор для инъекций: при конвульсиях ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутривенно.

Ignatia-Homaccord

(Игнация-Гомаккорд)

- Ignatia-Homaccord назначается при депрессиях, маниях, сварливости, при климактерических неврозах (в сочетании с Nervoheel, Hormeel S, Klimakt-Heel), при истерическом чувстве шара в пищеводе (попеременно с Ypsiloheel), при изменениях голоса, при повышенной нервной возбудимости. Применяется в педиатрии для терапии детей, которые много плачут (вместе или попеременно с Viburcol и Nervoheel). Также данный препарат показан для вспомогательной терапии при артериосклерозе, когда существует склонность к депрессиям, головным болям.

Ignatia-Homaccord (Игнация-Гомаккорд)

- Препарат также дополнительно назначается для иницирующей терапии при астме и эмфиземах у пациентов с затрудненным дыханием (особенно в сочетании с кислотами цикла лимонной кислоты, Carbo vegetabilis-Injeel, Sulfur-Injeel перорально или внутривенно).
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и СИМПТОМОВ.

Injeel-Chol (Инъель-Хол)

- 1,1 мл содержит:
- Chelidonium Д10, Д30, Д200,
- Belladonna Д10, Д30, Д200, Д1000 по 0,2 мкл,
- Carduus marianus Д10, Д30, Д200,
- China Д10, Д30, Д200,
- Calcium carbonicum Hahnemanni Д10, Д30, Д200,
- Lycopodium Д10, Д30, Д200, Д1000,
- Taraxacum Д10, Д30, Д200,
- Veratrum Д10, Д30, Д200 по 0,1 мкл.

Injeel-Chol (Инъель-Хол)

- Холангиты, холециститы, камнеобразование в желчном пузыре, дисфункция печени, хронические гепатиты.
- В острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле п/к, в/м, в/к, в/в.

Injeel-Chol (Инъель-Хол)

- Injeel-Chol назначается при нарушениях функций печени, поражениях паренхимы печени, желтухе, гепатите, вирусном гепатите (наряду с Engystol N), при острой желтой атрофии печени (токсической или ретоксической); при холангите, холецистите, желчнокаменной болезни в сочетании с коликами или без них.

Injeel-Chol (Инъель-Хол)

- Injeel-Chol назначается при заболеваниях различных фаз, так как печень поражается при многих заболеваниях (особенно ретоксических). Данный препарат может назначаться в смеси или попеременно с Herveel, Chelidonium-Homaccord, Galium-Heel. При нагноениях (эмфиемах) каждые сутки показаны инъекции Injeel-Chol в сочетании с Traumeel S.

Kalmia compositum

(Кальмия композитум)

- Капли: 100 г содержат:
 - Kalmia Д8,
 - Mercurius praecipitatus ruber Д10,
 - Asa foetida Д8 по 1 г. Содержит алкоголя 35 объемных %.
-
- Раствор для инъекций: 2,2 мл содержат:
 - Kalmia Д8, Mercurius praecipitatus ruber Д10,
 - Asa foetida Д8 по 22 мкл.

Kalmia compositum

(Кальмия композитум)

- Болезни суставов и соединительной ткани, например, артриты, артрозы, периартриты, болезни сухожилий и связок, болезни надкостницы и соединительной ткани сосудов; (сифилитические) заболевания сердца, хронические дерматозы.
- Капли: обычно по 10 кап. 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут (не более 2 часов).



Kalmia compositum

(Кальмия композитум)

- Раствор для инъекций: В острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле п/к, в/к, в/м, в/в.

Kalmia compositum

(Кальмия композитум)

- Kalmia compositum назначается при острых и хронических воспалениях надкостницы в сочетании со студенистым пропитыванием соединительной ткани, при артрите и артрозе со склонностью к деформации костей и болям в костях и надкостнице; экспериментально - при склонностях к образованию аневризм на центральных и периферических артериях (часто с отдающимися в правую руку болями).

Kalmia compositum

(Кальмия композитум)

- Препарат применяется попеременно с Traumeel S, Zeel, Neuralgo-Rheum-Injeel, Colocynthis-Homaccord, Discus compositum (см. также "Коррекция осанки по Александеру").
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 10 капель, а при болях - каждые 15 минут по 10 капель. Парентеральная терапия: сначала - 1 ампула в сутки, потом - по 1 ампуле 1-2 раза в неделю в область боли или воспалений, внутримышечно, внутривенно, подкожно и в кожу.

Klimakt-Heel (Климакт-Хеель)

- 1 таблетка содержит:
- Sanguinaria Д3, Sepia Д4, Sulfur Д4,
- Ignatia Д4, Cedron Д4 по 30 мг,
- Stannum Д12 60 мг, Lachesis Д12 90 мг.
- Климактерические нарушения.



Klimakt-Heel (Климакт-Хеель)

- Обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день.

Klimakt-Heel (Климакт-Хеель)

- Данный препарат показан при гормональных расстройствах, особенно в климактерический период, хотя он назначается не для заместительной гормональной терапии. Он оказывает биологическое стимулирующее воздействие на деятельность яичников и на внутри секреторные контролирующие системы организма (переднюю долю гипофиза, гипоталамус). Терапевтический эффект Klimakt-Heel основывается на связывании активных действующих веществ и их потенцировании.

Klimakt-Heel (Климакт-Хеель)

- Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Klimakt-Heel назначается при климактерических выделениях в сочетании с выделениями пота и без них; при сильных сердцебиениях, пульсации сосудов, чувстве шара в пищеводе, судорогах, нейровегетативных симптомах (дистонии); при состояниях истощения, неврозах, депрессиях, меланхолическом настроении в климактерический период, а также при краурозе (наряду с Mercurius-Heel S, Mezereum-Homaccord, Schwef-Heel, Hormeel S, Sulfur-Injeel, Engystol N, Galium-Heel и т.п.)

Klimakt-Heel (Климакт-Хеель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет в начале терапии по 1 таблетке каждые 1-2 часа, позже - 3-4 раза в сутки по 1 таблетке.

Klimakt-Heel (Климакт-Хеель)

- После проведенного курса гормональной терапии дополнительно рекомендуются внутримышечные инъекции смеси Metro-Adnex-Injeel, Ovarium suis-Injeel (forte), Placenta suis-Injeel (forte) 1-2 раза в неделю. Терапевтический эффект может быть усилен при помощи инъекций смеси кислот цикла лимонной кислоты, Engystol N и Traumeel S.

Lamioflur (Ламиофлюр)

100 г содержат:

Lamium album Д4, Kreosotum Д6,

Geum urbanum Д5, Alumina Д12,

Lapathum acutum Д6, Platinum metallicum Д12 по 10 г,

Alchemilla vulgaris Д3, Natrium carbonicum Д6,

Asterias rubens Д6, Hepar sulfuris kalinum Д4,

Acidum nitricum Д6, Hydrastis Д4, Mezereu Д4,

Viola tricolor Д4 по 5 г. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Lamioflur (Ламиофлюр)

- Болезни кожи и слизистых оболочек, в т. ч. Fluor albus, острый и хронический ринит, воспаления придаточных пазух носа.
- Обычно по 10 капель 3 раза в день. При острых формах начинают с 10 капель каждые 15 минут.

Lamioflur (Ламиофлюр)

- Lamioflur назначается при кожных заболеваниях и заболеваниях слизистых оболочек, сопровождающихся выделением резких, едких, зудящих и неприятно пахнущих секретов, особенно в области естественных отверстий тела, например, при белях, Erosio portiones, кольпите, при зуде, цистите и уретрите, при рините, воспалениях придаточных пазух носа, глоссите, ларингите, бронхите, бронхоэктазах, эзофагите и гастрите; при нагноениях фистул, экземах, дерматите, дерматозах, включая млечный струп; при преканцерозах и новообразованиях.

Lamioflur (Ламиофлюр)

- При дегенеративных заболеваниях рекомендуется попеременно назначать Galium-Heel (перорально, внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу).
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов.

Leptandra compositum (Лептандра КОМПОЗИТУМ)

- Капли: 100 г содержат:
- Leptandra Д2, Quassia amara Д3,
- Podophyllum Д3, Acidum arsenicosum Д4,
- Carbo vegetabilis Д10,
- Niccolum metallicum Д10, Phosphorus Д6 по 1 г.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.

Leptandra compositum (Лептандра КОМПОЗИТУМ)

- Раствор для инъекций: 2,2 мл содержат:
- Leptandra Д2, Quassia amara Д3,
- Podophyllum Д3, Acidum arsenicosum Д4,
- Carbo vegetabilis Д10,
- Niccolum metallicum Д10, Phosphorus Д6 по 2,2 мкл.

Leptandra compositum (Лептандра КОМПОЗИТУМ)

- Эпигастральный синдром, особенно хронические заболевания печени и поджелудочной железы при остром приступе (после нарушения диеты), вздутие живота. Для активизации иммунной системы.
- Капли: обычно 10 кап. по 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 кап. каждые 15 минут.

Leptandra compositum (Лептандра КОМПОЗИТУМ)

- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Leptandra compositum (Лептандра КОМПОЗИТУМ)

- Leptandra compositum назначается при синдроме эпигастральной области, при воспалительных и застойных проявлениях в области печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Данные заболевания характеризуются ярко красным, как бы лакированным языком (при острых воспалениях печени), желто-коричневым (при заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков) или белым налетом на языке (при заболеваниях пищеварительного тракта).

Leptandra compositum (Лептандра КОМПОЗИТУМ)

- Учитывая различный патогенез данных заболеваний, дополнительно назначаются препараты Momordica compositum (при заболеваниях поджелудочной железы), Injeel-Chol, Chelidonium-Homaccord, Hepar compositum и Heparol (при нарушениях функций печени, холангите и холецистите), Anacardium-Homaccord, Erigotheel и Mucosa compositum (язва желудка и двенадцатиперстной кишки), Spascupreel (при спазмах), Nux vomica-Homaccord (общие нарушения функций кишечника), Gastricumel (при комплексе гастрокардиальных симптомов по Ремхельду).

Leptandra compositum (Лептандра КОМПОЗИТУМ)

- При хронических заболеваниях, особенно при циррозе печени, и после вирусного гепатита наряду с *Leptandra compositum* показан препарат *Hepar compositum*.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 2-4 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов.

Leptandra compositum (Лептандра КОМПОЗИТУМ)

- Парентеральная терапия: при болях - 1 ампула в сутки внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу попеременно с другими показанными препаратами (*Momordica compositum* и т.п.); в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно и в кожу (под правую реберную дугу или лопатку, а также в область седьмого позвонка).

Lithimeel (Литиумель)

- 1 таблетка содержит:
 - Lithium carbonicum Д3, Colchicum Д4,
 - Ferrum phosphoricum Д6,
 - Natrium carbonicum Д4 по 30 мг,
 - Nux vomica Д6, Rhus toxicodendron Д6 по 90 мг.
-
- Ревматоидный артрит, диатез при подагре и ревматизме.

Lithimeel (Литиумель)

- Обычно: сосать по 1 таблетке 3 раза в день.

Lithimeel (Литиумель)

- Lithiumeel назначается при подагре, ревматическом диатезе, при ревматических заболеваниях, артрите, коксите, первичном хроническом полиартрите в сочетании с опуханием суставов, при заболеваниях коленных суставов.

Lithimeel (Литиумель)

- Наряду с данным препаратом применяются Ferrum-Homaccord (ревматический диатез, синдром "плечо-рука"), Rheuma-Heel (общее средство при ревматических заболеваниях), Colocynthis-Homaccord и Dulcamara-Homaccord (при ишиасе и коксите), Rhododendroneel S (ревматизм в сочетании с ухудшением состояния при изменениях погоды, бессонницей), Spascupreel (колющие и судорожные боли) и т.п.

Lithimeel (Литиумель)

- Lithimeel назначается для терапии заболеваний различных фаз, так как он способствует выведению мочи.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 1-4 раза в сутки по 1 таблетке в сочетании с дополнительными показанными препаратами.

Lymphomyosot (Лимфомиозот)

- Капли: 100 г содержат:
- *Myosotis arvensis* Д3, *Veronica* Д3,
- *Teucrium scorodonia* Д3, *Pinus silvestris* Д4,
- *Gentiana lutea* Д5, *Equisetum hiemale* Д4,
- *Sarsaparilla* Д6, *Scrophularia nodosa* Д3,
- *Juglans* Д3, *Calcium Phosphoricum* Д12,
- *Natrium sulfuricum* Д4, *Fumaria officinalis* Д4,
- **Levothyroxin** Д12, *Aranea diadema* Д6 по 5 г,
- *Geranium robertianum* Д4,
- *Nasturtium aquaticum* Д4,
- *Ferrum jodatum* Д12 по 10 г. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Lymphomyosot (Лимфомиозот)

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- Myosotis arvensis Д3, Veronica Д3,
- Teucrium scorodonia Д3, Pinus silvestris Д4,
- Gentiana lutea Д5, Equisetum hiemale Д4,
- Sarsaparilla Д6, Scrophularia nodosa Д3,
- Juglans Д3, Calcium Phosphoricum Д12,
- Natrium sulfuricum Д4, Fumaria officinalis Д4,
- **Levothyroxin Д12**, Aranea diadema Д6 по 0,55 мкл,
- Geranium robertianum Д4,
- Nasturtium aquaticum Д4,
- Ferrum jodatum Д12 по 1,1 мкл.

Lymphomyosot (Лимфомиозот)

- Лимфатизм (склонность к чрезмерному развитию лимфатических органов, к образованию отеков, к инфекциям), опухания желез, гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит.
- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день.

Lymphomyosot (Лимфомиозот)

- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле п/к, в/м, в/к, в/в.
- Lymphomyosot назначается при экссудативном и лимфатическом диатезе, слабости, скрофулезе, прочих опуханиях желез, при гипертрофии миндалин, хронической тонзиллярной ангине, при соматических расстройствах и нарушениях умственного развития.

Lymphomyosot (Лимфомиозот)

- Данный препарат также показан при кардиальных (недостаточность левого и правого желудочков сердца) и почечных отеках (нефрит, нефроз, другие нефропатии); нарушениях оттока лимфатической жидкости после операций или травм (лимфатические отеки); при нейродермите, экземах, эндогенных дерматозах. Он является дезинтоксикационным и дренажным средством при фазах импрегнации, дегенерации и новообразований, а также служит для выведения шлаков из мезенхимы при заболеваниях печени.

Lymphomyosot (Лимфомиозот)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 15-20 капель для длительной терапии. При почечных отеках (нефрозах) требуется многомесячный курс терапии (в сочетании с препаратами Albumoheel, Berberis-Homaccord и т.п.) При преканцерозах и раке дополнительно назначаются Heparin, Psorinoheel, Galium-Heel, Traumeel S, Engystol N. Парентеральная терапия: при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутривенно и в кожу.



Melilotus-Homaccord® N Tropfen
(Мелилотус – Гомаккорд Н Тропфен)

**Melilotus-Homaccord® (Мелилотус –
Гомаккорд)**

- 
- Капли: 100 мл содержат:
 - *Melilotus officinalis* Д1, Д4, Д10, Д30, Д200 по 0,2 г,
 - *Crataegus* 60 г, Д10, Д30, Д200 по 0,8 г.
Содержание алкоголя 45 объемных %.
-
- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
 - *Melilotus officinalis* Д2, Д4, Д10, Д30, Д200 по 2,2 мкл,
 - *Crataegus* Д2, Д10, Д30, Д200 по 8,8 мкл.

- 
- Полнокровие, предапоплексические состояния, гипертония.

- 
- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут (в течение не более 2 часов).
 - Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю по 1 ампуле п/к, в/м, в/к, в/в.

- Melilotus-Homaccord назначается при гипертонии, плеторе, притоке крови к голове в сочетании с головными болями и головокружениями (наряду с Vertigoheel); при кровотечениях из носа, предапоплексических состояниях, болях в сердце (попеременно с Aurumheel N и Cardiacum-Heel); при нарушениях коронарного кровоснабжения и стенокардии (попеременно с Glonoin-Homaccord N).

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях и возможности инсульта - каждые 15 минут по 10 капель (в сочетании с Paraver-Injeel, Belladonna-Injeel и т.п.)
Парентеральная терапия: при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки, в прочих случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу.

Mercurius-Heel S

(Меркуриус-Хеель С)

- 1 таблетка содержит:
- Mercurius solubilis Hahnemanni Д10 90 мг,
- Hepar sulphuris Д8, Lachesis D12,
- Phytolacca Д4, Ailanthus glandulosa Д3,
- Echinacea angustifolia Д3 по 30 мг,
- Belladonna Д4 60 мг.

Mercurius-Heel S

(Меркуриус-Хеель С)

- Фурункулезы, карбункулы и другие нагноения, включая, например, и те, что есть в тканях миндалин.
- Обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день, в острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.

Mercurius-Heel S

(Меркуриус-Хеель С)

- Mercurius-Heel S назначается при гнойных реактивных фазах заболеваний, например, абсцессов, фурункулов, карбункулов, абсцессах миндалин, абсцессах потовых желез, при панариции, пиодермии, сикозе, пиелите, при абсцессах в области альвеолярного отростка, энтероколите. Данный препарат также является дополнительным средством при различных кожных заболеваниях, экземах, дерматозах, при цистите, баланите, метрите, при абсцессе Дугласа (наряду с Gynaecoheel, Hormeel S, Traumeel S), при зуде (вместе с Klimakt-Heel, Mezereum-Homaccord, Hormeel S и т.п.)

Mercurius-Heel S

(Меркуриус-Хеель С)

- Попеременно могут применяться Mercurius-Heel S, Arnica-Heel, Traumeel S, Cruroheel S, благодаря чему можно усилить терапевтический эффект (в зависимости от интоксикации и симптоматики заболевания). Для вспомогательной терапии могут назначаться Angin-Heel S, Dulcamara-Homaccord, Lymphomyosot, Belladonna-Homaccord, Veratrum-Homaccord, Psorinoheel, Sulfur-Heel, а при сильных процессах регрессивной викариации - Cruroheel S и Arsuraneel.

Mercurius-Heel S

(Меркуриус-Хеель С)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет в начале терапии - каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов, потом - 3-4 раза по 1 таблетке в сутки.

Metro-Adnex-Injeel

(Метро-Аднекс-Инъель)

- 1,1 мл содержит:
- *Apis mellifica* Д10, Д30, Д200,
- *Lachesis* Д10, Д30, Д200, Д1000,
- *Lilium tigrinum* Д10, Д30, Д200,
- *Lycopodium* Д10, Д30, Д200, Д1000,
- *Hydrargyrum bichloratum* Д10, Д30, Д200 по 1,1 мкл;
- *Pulsatilla* Д10, Д30, Д200, Д1000,
- *Crabro vespa* Д10, Д30, Д200 по 1,65 мкл,
- *Cimicifuga* Д10, Д30, Д200 по 2,2 мкл.

Metro-Adnex-Injeel

(Метро-Аднекс-Инъель)

- Аднекситы, параметриты, миометриты, эндометриты, вагиниты, дисменорея, предменструальные боли, климактерические невроты.
- В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю по 1 ампуле в/В, в/м, п/к, в/к.



Metro-Adnex-Injeel **(Метро-Аднекс-Инъель)**

- Metro-Adnex-Injeel назначается для активации неспецифической защиты при воспалительных процессах и при функциональных расстройствах женских половых органов.

Metro-Adnex-Injeel

(Метро-Аднекс-Инъель)

- Т.о., данный препарат показан при аднексите, воспалении яичников, воспалении фаллопиевых труб, параметрите, эндометрите, вагините, кольпите, абсцессе Дугласа, дисменоррее, при климактерических неврозах, боли внизу живота в середине менструального периода, при нарушениях функций яичников, при болях в крестце вследствие ретоксических поражений после терапии белей; в климактерический период.

Metro-Adnex-Injeel

(Метро-Аднекс-Инъель)

- Metro-Adnex-Injeel вызывает регрессивную викариацию фаз импрегнации (например, ретоксических белей); при этом рекомендуется дополнительно назначать Traumeel S, оказывающий действие на ГОМОТОКСИНЫ.

Metro-Adnex-Injeel

(Метро-Аднекс-Инъель)

- Для специфического воздействия на органы часто назначаются инъекции смеси Metro-Adnex-Injeel с другими препаратами (при заболеваниях женских половых органов фаз депонирования, импрегнации, дегенерации, реактивной фазы и фазы новообразований).

Metro-Adnex-Injeel

(Метро-Аднекс-Инъель)

- При заболеваниях клеточных фаз в смесь добавляются соответствующие суис-органные препараты, например, Uterus suis-Injeel (+forte), Ovarium suis-Injeel (+forte) и т.п.

Metro-Adnex-Injeel

(Метро-Аднекс-Инъель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, подкожно, внутримышечно (аутогемотерапия), в кожу (неврально). Данный препарат может применяться в форме "питьевых ампул" (1 ампула разводится на стакан воды и пьется в течение суток).

Mezereum-Homaccord (Мезереум-Гомаккорд)

- Капли: 100 г содержат:
- Mezereum Д2, Д10, Д15, Д30, Д200,
- Acidum arsenicosum Д4, Д10, Д15, Д30, Д200, Д1000 по 0,5 г. Содержит алкоголя 35 объемных %.
- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- Mezereum Д4, Д10, Д15, Д30, Д200,
- Acidum arsenicosum Д6, Д10, Д15, Д30, Д200, Д1000 по 5,5 мкл.

Mezereum-Homaccord (Мезереум-Гомаккорд)

- Пузырьковые экземы, опоясывающий лишай, прурит.

Mezereum-Homaccord (Мезереум-Гомаккорд)

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут. Длительное применение препарата допускается только под контролем врача.
- Раствор для инъекций: В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю по 1 ампуле п/к, в/в, в/к, в/м.

Mezereum-Homaccord (Мезереум-Гомаккорд)

- Mezereum-Homaccord назначается при пузырьковых экземах в сочетании с жжением и зудом, при вульвите, зуде, при детской папулезной крапивнице, крапивнице, опоясывающем лишае.
- Также данный препарат показан при невралгиях в сочетании с парестезией.

Mezereum-Номассорд (Мезереум-Гомаккорд)

- Mezereum-Номассорд применяется при заболеваниях кожи и слизистых оболочек, при болях в костях по ночам (вместе с Osteoheel S и Cruroheel S), при нагноениях фистул и определенных формах белей. Его действие хорошо дополняет Normeel S (заболевания слизистых оболочек), Abropernol и Psorinoheel (дискратические кожные заболевания).

Mezereum-Nomaccord (Мезереум-Гомаккорд)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов, в сочетании с другими препаратами (например, с Ranunculus-Nomaccord при опоясывающем лишае). Парентеральная терапия: сначала - 1 ампула в сутки, потом - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, внутривенно, подкожно и в кожу (неврально).

Molybdaen compositum (Молибден КОМПОЗИТУМ)

- 1 таблетка содержит:
- Natrium molybdaenicum Д3 15 мг,
- Zincum gluconicum Д3,
- Magnesium asparaginicum Д3,
- Ferrum -II- Fumaricum Д4,
- Cobaltum-II-gluconicum Д4,
- Cerium-III-oxalicum Д4,
- Kalium asparaginicum Д4,
- Manganum gluconicum Д4, Cuprum sulfuricum Д6,
- Niccolum aceticum Д8, Rhubidium chloricum Д8,
- Sulfur Д6, Phosphorus Д6 по 3 мг.

Molybdaen compositum (Молибден КОМПОЗИТУМ)

- Регуляция минерального обмена, дефицит какого ни будь элемента после приема лекарств (включая дегенеративные изменения и новообразования).

Molybdaen compositum (Молибден КОМПОЗИТУМ)

- В обычных случаях начинают прием ежедневно: 1 таблетку оставить под языком до растворения с водой или без воды; позднее- каждые два дня.

Molybdaen compositum (Молибден КОМПОЗИТУМ)

- Molybdaen compositum назначается для регуляции содержания минеральных веществ в организме и для компенсации их нехватки (особенно при дегенеративных заболеваниях и новообразованиях).
- Путем поддержания достаточного количества минеральных веществ, данный препарат оказывает воздействие при нарушениях функций ферментов и при блокаде ферментных систем.

Molybdaen compositum (Молибден КОМПОЗИТУМ)

- Терапевтический эффект усиливается входящими в состав препарата потенцированными компонентами: молибденом, цинком, магнием, железом, кобальтом, калием, марганцем, медью, никелем, рубидием, серой и фосфором; при этом связывание данных минералов с органическими кислотами (аспарагиновой, глюконовой, фумаровой) благоприятно действует на клетки и их ферменты.

Molybdaen compositum (Молибден КОМПОЗИТУМ)

- Действие Molybdaen compositum может быть усилено сочетанным применением других препаратов, активизирующих ферментные системы (Coenzyme compositum, Ubichinon compositum), а также другими комплексными препаратами фирмы "Heel", показанными при функциональных расстройствах. Эффект биологических препаратов дополняется регулированием содержания микроэлементов в организме, благодаря чему достигается комплексное воздействие (в соответствии с принципом Бюрги).

Molybdaen compositum (Молибден КОМПОЗИТУМ)

- Molybdaen compositum может назначаться для компенсации недостатка микроэлементов в организме - по 1 таблетке каждые 1-3 дня.
- Обычно терапию начинают с дозы 1 таблетка в сутки (в течение 3-4 дней, а при отсутствии побочных эффектов - в течение 8-10 суток). Позже переходят на дозу 1-3 таблетки в неделю.

Molybdaen compositum (Молибден КОМПОЗИТУМ)

- Необходимо избегать передозировки препарата, так как микроэлементы в больших дозах могут оказывать токсическое воздействие. Как показывает опыт, доза 0,015 мг молибдата натрия, содержащегося в каждой таблетке, достаточно для заместительной терапии; то же относится и к другим микроэлементам в составе данного препарата.

Molybdaen compositum (Молибден КОМПОЗИТУМ)

- При появлении нежелательных симптомов необходимо на 3-5 дней прекратить прием препарата, после чего снизить дозу его применения.

Molybdaen compositum (Молибден КОМПОЗИТУМ)

- При указанной дозировке обычно не наблюдается побочных нежелательных эффектов. Но возможны определенные особенности сочетанного применения с другими биологическими препаратами, которые могут выражаться в чрезмерных реакциях организма на препарат. В подобных случаях необходимо выяснить причины подобной реакции, прекратить на некоторое время прием данного препарата.

Molybdaen compositum (Молибден КОМПОЗИТУМ)

- Обычно для поддержания необходимого количества микроэлементов достаточно дозы 1 таблетка в неделю. При тяжелых дискразиях рекомендуется в течение 1-3 недель принимать по 1 таблетке каждые сутки. Длительная терапия при той же дозе показана и при новообразованиях, так как организм больного раком содержит обычно крайне мало молибдена.

Momordica compositum

(Момордика композитум)

- 2,2 мл содержат:
- Momordica balsamina Д6, Jodum Д8,
- Podophyllum Д6,
- Mercurius solubilis Hahnemanni Д8,
- Ceanothus americanus Д6,
- Carbo vegetabilis Д10, Lycopodium Д6,
- Lachesis Д10, Mandragora Д8,
- Argentum nitricum Д12, Veratrum Д4 по 22 мкл.



Momordica compositum

(Момордика композитум)

- Регулирующее антигомотоксическое воздействие при панкреатитах и нарушениях функций поджелудочной железы; заболевания поджелудочной железы и эпигастральной области.



Momordica compositum

(Момордика композитум)

- В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле п/к, в/м, в/к, в/в.



Momordica compositum

(Момордика композитум)

- Momordica compositum назначается при нарушениях функций поджелудочной железы, так как оказывает регулятивный антигомтоксический эффект при панкреатите.

Momordica compositum

(Момордика композитум)

- Данный препарат показан, таким образом, при заболеваниях поджелудочной железы; при этом при неясных симптомах дополнительно назначается парентеральная терапия препаратами Injeel-Chol и Hepar, а при хронических заболеваниях - Hepar compositum, Coenzyme compositum и Ubichinon compositum. Также при заболеваниях двенадцатиперстной кишки попеременно может назначаться Mucosa compositum (парентерально), при диабете - Syzygium compositum (перорально), а при сопутствующих сердечных заболеваниях - Strophanthus compositum и Cor compositum.

Momordica compositum

(Момордика композитум)

- При болях в эпигастральной области необходимо точно выяснить их причины; если при терапии Momordica compositum наступает улучшение, то одной из причин является нарушение деятельности поджелудочной железы. Данный препарат также может назначаться для вспомогательной терапии при язве двенадцатиперстной кишки (наряду с Erigotheel и Anacardium-Homaccord).

Momordica compositum

(Момордика композитум)

- При заболеваниях поджелудочной железы, желчных протоков и гепатите попеременно могут назначаться препараты Leptandra compositum, Chelidonium-Homaccord, Injeel-Chol.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу. Дополнительно показана пероральная терапия препаратами Cardiacum-Heel, Duodenoheel, Chelidonium-Homaccord, Cralonin, Glonoin-Homaccord.

Mucosa compositum

(Мукоза композитум)

- 2,2 мл содержат:
- Mucosa naris suis Д8, Mucosa oris suis Д8,
- Mucosa pulmonis suis Д8, Mucosa oculi suis Д8,
- Mucosa vesicae felleae suis Д8,
- Mucosa vesicae urinariae suis Д8,
- Mucosa pilori suis Д8, Mucosa duodeni suis Д8,
- Mucosa oesophagi suis Д8, Mucosa jejuni suis Д8,
- Mucosa ilei suis Д8, Mucosa coli suis Д8,
- Mucosa recti suis Д8,
- Mucosa ductus choledochi suis Д8,
- Ventriculus suis Д8, Pankreas suis Д10,

Mucosa compositum

(Мукоза композитум)

- Argentum nitricum Д6, Belladonna Д10,
- Oxalis acetosella Д6, Anacardium Д6,
- Phosphorus Д8, Lachesis Д10,
- Ipecacuana Д8, Nux vomica Д13,
- Veratrum Д4, Pulsatilla Д6,
- Kreosotum Д10, Sulfur Д8,
- Natrium oxalaceticum Д8, Colibacillinum Д28,
- Condurango Д6, Kalium bichromicum Д8,
- Hydrastis Д4, Mandragora Д10,
- Momordica balsamina Д6, Ceanothus Д4 по 22 мкл.

Mucosa compositum

(Мукоза композитум)

- Стимуляция защитных сил при болезнях слизистых оболочек и катарах различных типов и локализации, в т. ч. желудочно-кишечного тракта с язвами и без язв, в области верхних и нижних отделов дыхательных путей, мочеиспускательного канала и конъюнктивы.

Mucosa compositum

(Мукоза композитум)

- В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю по 1 ампуле п/к, в/к, в/м, или при необходимости в/в.

Mucosa compositum

(Мукоза композитум)

- Mucosa compositum назначается при заболеваниях и катарах слизистых оболочек, пищеварительных желез, при дуодените, гастрите, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, спазмах кишечника, кардиоспазмах, дивертикулите; в качестве дополнительного средства при панкреатите, холецистите, холангите, при предрасположенности к кишечной непроходимости,

Mucosa compositum

(Мукоза композитум)

- при атонии кишечника, диаррее, анальных экземах, тучности, анальных трещинах, конъюнктивите, при воспалениях придаточных пазух носа, катарах евстахиевой трубы, дисбактериозе, при комплексе гастрокардиальных симптомов, повышенной кислотности, при запорах, хроническом бронхите, астме, пиелите, цистите, простатите, уретрите, вагините; при стоматите, трахеите, ларингите, до и после операций желудка и кишечника, бронхов, гортани; а также при новообразованиях для выведения гомотоксинов.

Mucosa compositum

(Мукоза композитум)

- При запорах необходимо инъецировать препарат в область носо-губной складки (20-я точка толстой кишки в акупунктуре). Mucosa compositum содержит вытяжки различных слизистых оболочек, противовоспалительные средства (Argentum nitricum, Belladonna и т.п.), а также компоненты, оказывающие специфическое воздействие на эпигастральную область, привратник желудка, поджелудочную железу, тонкий и толстый кишечник. Данный препарат также показан при цистите, вызванном кишечной палочкой. Компоненты, препятствующие появлению новообразований (Hydrastis, Condurango), определяют применение препарата для предотвращения прогрессивной викариации (при заболеваниях клеточных фаз).

Mucosa compositum

(Мукоза композитум)

- Mucosa compositum показан для терапии различных заболеваний слизистых оболочек (наряду с Duodenoheel, Gastricumeel, Nux vomica-Homaccord, Veratrum-Homaccord, Ceanothus-Homaccord и т.п.)

Mucosa compositum

(Мукоза композитум)

- В сочетании с *Atropinum compositum* данный препарат назначается при спастических проявлениях органов, имеющих слизистую оболочку, например, при коликах желчного пузыря. Смесь данных препаратов инъецируется в область правой реберной дуги по методу "волдыря", а также внутрикожно под правую лопатку.

Mucosa compositum

(Мукоза композитум)

- При заболеваниях придаточных пазух носа, а также при отите рекомендуется дополнительно назначать Euphorbium compositum.
- В случае процессов аутоагрессии может назначаться ступенчатая аутогемотерапия данными препаратами.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно (в том числе, аутогемотерапия), подкожно и в кожу.