



Практика по ПСИХОПАТОЛОГИИ №3

Работу выполнила студентка 2 курса группы лого-1
ИДОиР РГПУ им. А. И. Герцена Серова Елизавета
09.10.2021

План презентации

Краткое содержание:

1. Понятие семиотики (Медицинская, Семиотика в психопатологии, Общая семиотика, Частная семиотика)
2. Различия медицинской и общей семиотики
3. Семиотика в психопатологии
4. Понятие психопатологического синдрома
5. Распространение заболеваний, имеющих в составе диагноза психопатологический синдром
6. Типы психопатологических синдромов
7. Первая помощь при эпилепсии

Понятие семиотики

Медицинская семиотика

01

Семиотика (от др.-греч. σημειωτικός «знак, признак»), семиология или симптоматология (др.-греч. σύμπτωμα «признак» + λόγος мн.ч. от λόγος «понятие, учение») — направление в медицине, в котором изучаются знаки и симптомы различных заболеваний.

Семиотика в психопатологии

03

В психопатологии семиотика или симптоматология изучает симптомы психиатрической патологии.

Частная семиотика

Предмет **частной семиотики** — симптомы конкретных заболеваний, их диагностическое значение, механизмы возникновения, причины возможного отсутствия, особенности их сочетания (сочетание симптомов называется синдромом).

02

Общая семиотика

Различают общую и частную семиотику. Предмет изучения **общей семиотики** — признаки, относящиеся к общей характеристике больного (пол, возраст, национальность, профессия, наследственность, перенесённые заболевания, телосложение) и его состояния (изменение сознания; положение тела, выражение лица; лихорадка и т. д.).

04

Различие медицинской и общей семиотики



- Общая семиотика изучает также изменения функции и морфологии органов и лабораторных проб (например, диагностическое значение увеличения печени, особенности мочи и кала при желтухах и т. п.).



- Медицинская семиотика — важная составная часть диагностики.
- Кроме того — обобщенное название симптомов болезни (чаще описывается словом симптоматика).



Семиотика в психопатологии

Особенности:

- Учение определяет понятие о симптоме психического расстройства, его границах, структуре, исследует прогноз и диагностическое значение симптомов, их формирование (например, нейрохимическое или церебральное)
- Как пример, можно привести такие распространённые психопатологические симптомы, как аутизм, абулия, амимия, ангедония, апатия, галлюцинация и ли псевдогаллюцинация, иллюзия (вербальная, функциональная, аффективная), эхолалия, эхопраксия, стереотипия, симптом воздушной подушки. Некоторые из них в сочетании образуют психопатологические синдромы, например апато-абулический синдром.

llll






Психопатологический синдром (иногда называемый **психопатологическим симптомокомплексом**) — повторяющаяся совокупность симптомов, объединённых единством патогенеза, общими механизмами происхождения и характеризующих текущее состояние лица с психическим расстройством. Психопатологический синдром — одна из важнейших диагностических категорий психиатрии.”

—**Определение**



Карта распространения заболеваний имеющих в составе диагноза психопатологический синдром



Типы синдромов

Связь с
нозологическим
диагнозом

Психопатологические
синдромы не указывают
непосредственно на
нозологический диагноз.

Сложны
е

Аффективные синдромы
Бредовые синдромы

Просты
е

Аффективно-бредовые
синдромы
Синдромы двигательных
расстройств



10 ПРАВИЛ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ



КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ



1. Не паникуйте

Вы берете на себя ответственность за здоровье другого человека, а поэтому обязаны сохранять спокойствие и ясный ум.



2. Будьте рядом

Будьте рядом на протяжении припадка. Когда все закончится, успокойте человека и помогите ему прийти в себя.



3. Обеспечьте безопасность

Проследите, чтобы жертве приступа ничего не угрожало (транспорт, пешеходы).



4. Засеките время

Обязательно засеките время начала приступа.



5. Правильное положение

Опустите больного на землю и подложите ему что-нибудь мягкое под голову.



6. Осторожно с судорогами

Не удерживайте жертву в неподвижном состоянии, чтобы остановить судороги. Мышцы это не расслабит, но запросто может стать причиной травм.



7. Не пытайтесь разжать челюсть

Не пытайтесь разжать человеку челюсти и поместить между ними какие-то твердые предметы: есть риск, что он или случайно укусит вас, или раскрошит себе зубы.



8. Еще раз проверьте время

Если припадок длится больше пяти минут, звоните в скорую помощь.



9. Проверьте дыхательные пути

Как припадок прекратился, переверните человека набок. Проверьте дыхательные пути. Если ему все еще сложно дышать, вызывайте скорую.



10. Не оставляйте человека одного

Если он поранился или за первым приступом сразу же следует повторный, срочно обратитесь к врачу.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ


Первая помощь при приступе эпилепсии




МЯГКОЕ ПОД ГОЛОВУ



РАЗВЯЖИТЕ ГАЛСТУК



НАКЛОНИТЕ НА БОК



ЗАФИКСИРУЙТЕ
ВРЕМЯ ПРИПАДКА



В РОТ НИЧЕГО НЕ
ВСТАВЛЯТЬ



НЕ ДАВИТЬ



ПОСЛЕ ПРИСТУПА ...



... ПРЕДЛОЖИТЬ
ПОМОЩЬ



Спасибо за внимание!

