



Biologische Heilmittel Heel GmbH d

Diarrheel® S (Диархель С)

- 1 таблетка содержит:
 - Argentum nitricum Д8,
 - Acidum arsenicosum Д8, Colchicum Д6,
 - Colocynthis Д6,
 - Hydrargirum bichloratum Д8,
 - Podophyllum Д6, Veratrum Д4 по 30 мг;
 - Tormentilla Д2 60 мг.
-
- Острая и хроническая диарея, гастроэнтерит.

Diarrheel® S (Диархель С)

- Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.

Diarrheel® S (Диархель С)

- Diarrheel S показан при острой и хронической диарее, гастроэнтерите, диспепсии, дизентерии, тимпании и метеоризме, причинами которых являются расстройства пищеварительного тракта, печени и поджелудочной железы. Для связывания токсинов рекомендуется дополнительно принимать таблетки активированного угля, например, МВК (250 мг на таблетку). Принимать таблетки необходимо не менее чем через 30 минут после принятия Diarrheel S.

Diarrheel® S (Диархель С)

- Diarrheel S назначается при всех случаях нарушения функций пищеварительного тракта (особенно в сочетании с характерным для диареи стулом), при панкреатите, септических поносах при различных заболеваниях, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, холангите, холецистите, желчнокаменной болезни, дисбактерии и т.п.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 1 таблетке, а при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов.

Discus compositum

(ДИСКУС КОМПОЗИТУМ)

- 2,2 мл содержат:
- Vitamin C Д6 5 мл, Vitamin B1 Д6, Vitamin B2 Д6, Vitamin B6 Д6 по 1 мл,
- Nicotinsaureamid Д6 3 мл, **Discus intervertebralis suis Д8,**
- **Funiculus umbilicalis suis Д6,** **Cartilago suis Д8,**
- **Medulla ossis suis Д10,** **Embryo suis Д10,**
- **Glandula suprarenalis suis Д10,** Pulsatilla Д6,
- Mercurius praecipitatus ruber Д10, Sulfur Д28, Cimicifuga Д4,
- Ledum Д4, Gnaphalium polycephalum Д3, Colocynthis Д4,
- Secale cornutum Д6, Argentum Д10, Zincum metallicum Д10,
- Cuprum aceticum Д6, Aesculus Д6, **Medorrhinum Д8,**
- Ranunculus bulbosus Д4, Ammonium muriaticum Д8, China Д4,
- Kalium carbonicum Д6, Sepia Д10, Acidum picricum Д6,
- Berberis Д4, Silicea Д4, Calcium phosphoricum Д10,
- б-Liponsaure Д8, Natrium oxalaceticum Д6, Nadid Д6,
- Coenzym A Д10 по 2,2 мкл.

Discus compositum

(Дискус композитум)

- Остеохондроз. Болезни суставов (хронические артриты и артрозы), особенно невралгические и ревматические процессы в области позвоночного столба.
- Обычно по 1 ампуле п/к, в/м, в/к (невральная терапия) 1-3 раза в неделю.
- Discus compositum назначается для дезинтоксикации при остеохондрозе, заболеваниях суставов (хронические артриты и артрозы), особенно при невралго-ревматических заболеваниях в области позвоночника.

Discus compositum

(Дискус композитум)

- Сочетание потенций витаминов, органических препаратов, катализаторов, показанных гомеопатических веществ и микроэлементов оказывает значительный терапевтический эффект; при этом наряду с Discus compositum могут назначаться Colocynthis-Homaccord, Neuralgo-Rheum-Injeel, Cimicifuga-Homaccord, Zeel, Traumeel S, Spascupreel, China-Homaccord S и т.п.
- Для невралгической терапии рекомендуются сочетания с Procainum compositum, а при остеохондрозе и болезни Шойерманна - с Viscum compositum forte ("методом волдыря" в область боли).

Discus compositum

(Дискус композитум)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 1-3 раза в неделю по 1 ампуле (при терапии по методу волдыря можно назначать больше!) внутримышечно, подкожно и в кожу (неврально, сегментно, в область боли, в точки акупунктуры, около позвоночника) в сочетании с другими показанными препаратами.

Droperteel (Дропертель)

- 1 таблетка содержит:
- Drosera Д4 90 мг,
- Lachesis Д12,
- Carbo vegetabilis Д12 по 75 мг,
- Coccus cacti Д4,
- Kalium carbonicum Д12 по 30 мг.

Droperteel (Дропертель)

- Обычно по 1 таблетке 3 раза в день под язык. В острых случаях - по 1 таблетке каждые 15 минут в течение не более 2-х часов.
- Бронхиты различного генеза, в том числе застойные. Коклюш.

Droperteel (Дропертель)

- Droperteel назначается при коклюше, бронхите, бронхиолите, бронхиальной астме, ларингите, плеврите в сочетании с сильным кашлем, при других судорожных формах кашля (наряду с Tartephedreel, Husteel, Bronchalis-Heel, Drosera-Номассорд, Bryaconeel, Phosphor-Номассорд и т.п.), а также при застойном бронхите и эмфиземах.

Drosera-Homaccord **(Дрозера-Гомаккорд)**

- Капли 100 мл содержат:
- Drosera Д2, Д10, Д30, Д200,
- Cuprum aceticum Д4, Д10, Д30, Д200 по 0,5 мл на 35% спиртовом растворе.

Drosera-Homaccord

(Дрозера-Гомаккорд)

- Раствор для инъекций 1,1 мл содержит:
- Drosera Д4, Д10, Д30, Д200,
- Cuprum aceticum Д6, Д10, Д30, Д200 по 5,5 МКЛ.

Drosera-Homaccord **(Дрозера-Гомаккорд)**

- Коклюш, бронхиолит, астматический бронхит.

Drosera-Homaccord

(Дрозера-Гомаккорд)

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях - по 10 капель каждые 15 минут в течение не более 2-х часов.
Длительный прием препарата (на протяжении нескольких месяцев) должен осуществляться под контролем врача.

Drosera-Homaccord

(Дрозера-Гомаккорд)

- Раствор для инъекций: в острых случаях - ежедневно, в других - по 1 ампуле 3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Drosera-Homaccord (Дрозера-Гомаккорд)

- Drosera-Homaccord назначается при коклюше (наряду с Spascupreel, Droperteel, Tartephedreel, Husteel), при других формах кашля при бронхите, бронхиолите, ларингите, бронхиальной астме в сочетании со спастическими компонентами; катары при гриппе. При астме назначается длительная терапия вместе с Husteel, Tartephedreel, Spascupreel, Carbo vegetabilis-Injeel, Sulfur-Injeel и т.п.

Dulcamara-Homaccord

(Дулькамара-Гомаккорд)

- Капли: 100 мл содержит:
 - Dulcamara Д2, Д10, Д30, 200,
 - *Aranea diadema* Д10, Д30, Д200 по 0,5 мл на 35 % спиртовом растворе.
-
- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
 - Dulcamara Д4, Д10, Д30, Д200,
 - *Aranea diadema* Д8, Д10, Д30, Д200 по 5,5 мкл.

Dulcamara-Homaccord (Дулькамара-Гомаккорд)

- Любые ухудшения самочувствия в сырую погоду. Гипертрофия миндалин.
- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях - по 10 капель каждые 15 минут в течение не более 2-х часов.
Длительный прием (в течение нескольких месяцев) препарата должен осуществляться под контролем врача.

Dulcamara-Homaccord

(Дулькамара-Гомаккорд)

- Раствор для инъекций: в острых случаях - ежедневно, в других - по 1 ампуле 1-3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.
- Dulcamara-Homaccord назначается при гидрогеноидной конституции (по Грауфоглю), при ухудшениях состояния при влажной погоде, гипертрофии миндалин (наряду с Lymphomyosot, Varijodeel и т.п.), при кашле, гриппе, простудных катарах; при цистите, цистопиелите, невралгиях, мышечном ревматизме после простуды.

Dulcamara-Homaccord (Дулькамара-Гомаккорд)

- Также показан при отите и болях в ушах, Crusta lactea, нагноениях (вместе с Mezereum-Homaccord, Traumeel S-Salbe, Schwef-Heel, Sulfur-Heel).
- В сочетании с Rhododendroneel S и Lithiumeel назначается при коксите и артрозах.

Dulcamara-Homaccord

(Дулькамара-Гомаккорд)

- Данный препарат может применяться при различных фазах (как и Psorinoheel и/или Rhododendroneel S) для снижения чувствительности к перемене погоды.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов, в сочетании или попеременно с другими показанными препаратами. Парентеральная терапия: по 1 ампуле ежедневно - при острых заболеваниях, 1-3 раза в неделю - во всех остальных случаях внутривенно, внутримышечно, подкожно или в кожу.

Duodenoheel (Дуоденохель)

- 1 таблетка содержит:
 - Anacardium Д4, Argentum nitricum Д6,
 - Ipsecacuanha Д4, Jodum Д6 по 30 мг,
 - Lachesis Д12, Petroleum Д6,
 - Robinia pseudoacacia Д4 по 60 мг.
-
- Дуодениты, язва двенадцатиперстной кишки, повышенная кислотность желудочного сока.

Duodenoheel (Дуоденохель)


- Обычно - по 1 таблетке 3 раза в день под язык. В острых случаях - по 1 таблетке каждые 15 минут (в течение не более 2-х часов).

Duodenoheel (Дуоденохель)

- Duodenoheel назначается при гастрите, повышенной кислотности, диспепсии (наряду с Diarrheel S), при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при спазме привратника желудка, парапилорном синдроме.

Duodenoheel (Дуоденохель)

- Показан для дополнительной терапии при заболеваниях желчного пузыря (наряду с Chelidonium-Номасскорд, Непеел, Nuxvomica-Номасскорд, Сeanothus-Номасскорд и т.п.)
- Применяется для терапии панкреопатий (вместе с Diarrheel S, Spascupreel, Врыасонеел, Сeanothus-Номасскорд), при комплексе гастрокардиальных симптомов (вместе с Cardiacum-Heel), при язве желудка и двенадцатиперстной кишки (наряду с Erigotheel).



Echinacea compositum S
(Эхинацея композитум С)

Echinacea compositum forte S
(Эхинацея композитум форте
С)

Эхинацея композитум С: 2,2 мл

содержат:

- Echinacea angustifolia Д3, Aconitum Д3,
- Sanguinaria Д4, Sulfur Д8, Baptisia Д4, Lachesis Д10,
- Bryonia Д6, Eupatorium perfoliatum Д6, Pulsatilla Д8,
- Hydrargyrum bichloratum Д8, Thuja Д8,
- **Grippe-Nosode Д13,** Phosphorus Д8,
- **Cortisonacetat Д13,** **Streptococcinum Д18,**
- **Staphylococcinum Д18,** Phytolacca Д6,
- **Pyrogenium Д198,** Zincum metallicum Д10,
- Gelsemium Д6, Hepar sulfuris Д10,
- Rhus toxicodendron Д4, Arnica Д4,
- Acidum arsenicosum Д8, Argentum nitricum Д8,
- Euphorbium Д6 по 22 мкл.

Эхинацея композитум форте С: 2,2

мл содержат:

- Echinacea angustifolia Д3 0,44 мл,
- Aconitum Д5, Sanguinaria Д6, Sulfur Д10, Baptisia Д6,
- Lachesis Д12, Bryonia Д8, Eupatorium perfoliatum Д8,
- Pulsatilla Д10, Hydrargyrum bichloratum Д8, Thuja Д10,
- **Grippe-Nosode Д15,** Phosphorus Д10,
- **Cortisonacetat Д15,** **Streptococcinum Д20,**
- **Staphylococcinum Д20,** Phytolacca Д8,
- **Pyrogenium Д198,** Zincum metallicum Д10,
- Gelsemium Д8, Hepar sulphuris Д12,
- Rhus toxicodendron Д6, Arnica Д6,
- Acidum arsenicosum Д10, Argentum nitricum Д10,
- Euphorbium Д8 по 22 мкл.

- Стимуляция системы защиты организма при: лихорадке, воспалительных заболеваниях, гриппе, фурункулах, абсцессах, флегмонах, интоксикациях, гингивитах, стоматитах, синуситах, гастроэнтеритах, энтероколитах, циститах, пиелитах, кольпитах, лейкорее, аднекситах, гломерулонефритах, гнойных свищах, остеомиелитах, воспалениях среднего уха, кожных болезнях, маститах, карбункулах, инфекционном мононуклеозе.

- Внутримышечные или внутривенные инъекции должны подбираться индивидуально в зависимости от реакции пациента. Если существует необходимость достижения быстрого эффекта, то следует использовать Эхинацея композитум форте С, в других случаях, например, при лихорадке - Эхинацея композитум С. Для общей стимуляции защит систем - по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикочно или при необходимости внутривенно 1-3 раза в неделю.

- Данный препарат содержит гомеопатические компоненты, показанные при реактивных фазах, септических состояниях и вирусных заболеваниях, а также нозоды и микроэлементы. За счет этого он оказывает антигомтоксический обратный эффект при различных реактивных фазах, особенно в тех случаях, когда при регрессивной викариации наблюдаются сильные воспаления (применяется попеременно с Traumeel S, Engystol N, Hepar compositum).

- При лихорадочных реактивных фазах обычно применяется форма *Echinacea compositum S.* Но при некоторых особенно тяжелых интоксикациях (при сепсисе, хронических инфекциях, первичном хроническом полиартрите, преканцерозах и новообразованиях), когда требуется усиление действия компонентов *Echinacea*, назначается форма *Echinacea compositum forte S.*

- При клеточных фазах блокированы иммунные системы организма. Вследствие нарушений деятельности ферментных механизмов дезинтоксикации активизируются промежуточные гомотоксины, вызывающие вторичные синдромы и токсические симптомы. В подобных случаях, особенно при фазах дегенерации и новообразований, рекомендуется "ударная терапия" (Шпитци) соответствующими фармакологическими препаратами.

- Для стимуляции защитных систем и для активации функций вентилирования рекомендуется постепенно увеличивать дозы препарата согласно следующей схеме:
- 1-ый день - 0,5 ампулы Echinacea compositum forte S внутривенно;
- 2-ой день - 1 ампула Echinacea compositum forte S внутривенно;
- 3-ий день - 1 ампула Echinacea compositum forte S внутривенно;
- 4-ый день - 2 ампулы Echinacea compositum forte S внутривенно;
- 5-ый день - 2 ампулы Echinacea compositum forte S;
- 6-ой и 7-ой день - пропустить.

- После данного курса перейти на 1 внутривенную инъекцию через день; а позже - на 1 инъекцию в неделю.
- Если после внутривенной инъекции *Echinacea compositum forte S* появившаяся лихорадка не спадет до следующего дня, необходимо пропустить один день (не делать инъекций), чтобы дать защитным системам организма время для реакции.

- После этого необходимо выяснить, была ли данная лихорадка лишь промежуточной реакцией, или же речь идет об общей реакции дезинтоксикации организма; при этом необходимо учитывать, что воспаления являются биологически важными незаменимыми реакциями дезинтоксикации. При этом (с точки зрения процессов регрессивной викариации по Реккевегу) можно обратить дегенеративные фазы и новообразования в реактивные фазы и даже излечить их.

- Благоприятная регрессивная викариация может проявляться не только в виде лихорадки.
- При длительных лихорадках наряду с *Echinacea compositum forte S* (каждые 2-3 дня по 1 ампуле внутривенно) назначаются инъекции Engystol N, Traumeel S, Gripp-Heel. Дезинтоксикационные функции печени можно активизировать препаратом Herveel, а стимулировать выведение гомотоксинов через пищеварительный тракт - препаратами *Momordica compositum*, *Anacardium-Homaccord*, *Mucosa compositum*, *Nux vomica-Homaccord*.

Engystol N (Энгистол Н)

- 1,1 мл содержит:
- Vincetoxicum Д6, Д10, Д30 по 0,6 мл,
- Sulfur Д4, Д10 по 3,3 мкл.

- Для активации неспецифических защитных механизмов, особенно при гриппе и не идентифицированных вирусных болезнях с лихорадкой.

- В острых случаях - ежедневно по 1 ампуле, в других случаях - 1-3 раза в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Engystol N (Энгистол Н)

- Engystol N назначается для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях, после облучения рентгеном, при вирусных заболеваниях (вирусном гриппе, пневмонии, вирусном гепатите), после прививок от оспы, при афтозном стоматите.

Engystol N (Энгистол Н)

- Он показан при различных кожных заболеваниях (нейродермите, крапивнице, зуде, экземах, фурункулезе и т.п.), при заболеваниях дыхательных путей (бронхите, бронхоэктазах, коклюше, пневмонии и астме), при сердечно-сосудистых заболеваниях (пароксизмальной тахикардии, эндокардите), при мигренях, невралгиях, каузальгиях, при аллергиях любого вида и локализации (включая сенной насморк), при различных ревматических заболеваниях (включая подагру), при заболеваниях почек, печени и центральной нервной системы. Он применяется при фазах импрегнации и дегенерации (наряду с промежуточными кислотами цикла лимонной кислоты).

Engystol N (Энгистол Н)

- Engystol N снижает токсические перегрузки, последствия аллопатической терапии (фазы импрегнации и дегенерации), особенно при вирусных заболеваниях, характеризующихся внедрением вируса (гомотоксина) в клетку. При этом препарат не оказывает прямого виростатического эффекта. Эффект Engystol N основывается на действии винцетоксина и асклепиевой кислоты (компоненты *Vincetoxicum officinale*) на сосуды и симпатический нерв, а также на действии коллоидальной серы, которая деблокирует нарушенные ферментные функции (сульфид-ферменты) и активирует большую защитную систему и механизмы дезинтоксикации.

Engystol N (Энгистол Н)

- Таким образом, Engystol N, так же как и Lymphomyosot, оказывает дренажное воздействие на мезенхиму и лимфатическую систему. Именно на этом действии основаны показания: аллергии, вторичные заболевания, последствия других заболеваний (например, агранулоцитоз, неврит, заболевания почек, печени, костного мозга, сердечной мышцы, нефрит и т.п.)
- При тяжелых лихорадочных реактивных фазах, например, сепсисе, после приема Engystol N могут наблюдаться ухудшения состояния в течение 3-5 часов с последующей фазой компенсации.

Engystol N (Энгистол Н)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно или в кожу, часто вместе с кровью самого пациента. При вирусных заболеваниях - по 1 ампуле в сутки внутривенно до полного выздоровления (для детей - внутримышечно или подкожно). При гриппе инъецировать смесь (1 ампула Engystol N в сочетании с 2 ампулами Gripp-Heel и Traumeel S внутримышечно).

Erigotheel (Эриготель)

- 1,1 мл содержат:
- *Origanum vulgare* Д6, Д10, Д30 по 6,6 мкл,
- *Erythraeae centaarium* Д10, Д30 по 4,4 мкл.

- Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

- В острых случаях - по 1 ампуле ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Erigotheel (Эриготель)

- Erigotheel показан при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенной кислотности, при парапилорном синдроме (по Штрауссу), при гиперпарестезии, повышенной секреции и повышенной моторике желудка.

Erigotheel (Эриготель)

- Так как горькие вещества, из которых состоят оба компонента данного препарата, повышают возбудимость симпатического нерва, то эффект действия Erigotheel основывается на непрямом подавлении блуждающего нерва путем активизации симпатического. Наряду со спазмолитическим эффектом Erigotheel биологически регулирует секреторные функции слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, создавая при этом благоприятные условия для излечения язв и предотвращения рецидивов.

Erigotheel (Эриготель)

- Erigotheel также показан при хронических язвах и синдроме Дампинга (Dumping-Syndrom).
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: для длительной терапии (наиболее распространенной) - 3 инъекции в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно или в кожу в форме сегментной терапии в правую часть эпигастральной области или около позвоночника; при острых заболеваниях - по одной инъекции ежедневно в течение нескольких дней.

Erigotheel (Эриготель)

- Усилить терапевтический эффект можно за счет применения смеси с Traumeel S (внутривенно или внутримышечно).
- При наиболее устойчивых заболеваниях рекомендуется через день инъектировать вышеуказанную смесь, а в промежутках инъектировать по 1 ампуле Erigothell подкожно или "по методу волдыря".
- Дополнительно показана пероральная терапия Duodenoheel (3 раза в сутки по 1 таблетке), Anacardium-Номассорд (при хронических заболеваниях), Galium-Heel (при подозрении на преканцерозы).



Euphorbium compositum S
(Эуфорбиум композитум С)

Euphorbium compositum–Nasentropfen S
(Эуфорбиум композитум–Назентропфен
С)

- Капли 100 мл содержат:
- Euphorbium Д3, Pulsatilla Д2,
- Luffa operculata Д6, Mercurius bijodatus Д8,
- **Mucosa nasalis Д8,** Hepar sulfuris Д10,
- Argentum nitricum Д10, **Sinusitis-Nosode Д13** по 1 мл на 45% спиртовом растворе.

- Раствор для инъекций: 2,2 мл содержат:
- Euphorbium Д3, Pulsatilla Д2,
- Luffa operculata Д6, Mercurius bijodatus Д8,
- **Mucosa nasalis Д8,** Hepar sulfuris Д10,
- Argentum nitricum Д10, **Sinusitis-Nosode Д13** по 22 мкл.

- Капли в нос: 100 мл содержит:
- Euphorbium Д4, Pulsatilla Д2,
- Luffa operculata Д2,
- Mercurius bijodatus Д8,
- **Mucosa nasalis Д8**, Hepar sulfuris Д10,
- Argentum nitricum Д10,
- **Sinusitis-Nosode Д13** по 1 мл на физрастворе с 0,01% бензалкониумхлоридом.

- Капли: раствор для инъекций: острые и хронические синуситы, евстахеит, водянка среднего уха.
- Капли в нос: риниты различного генеза (вирусные, бактериальные, аллергические), сухой, гиперпластический и атрофический риниты, для вспомогательного лечения озоны. Хронические синуситы. Для облегчения носового дыхания при сенной лихорадке.

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут, снижая до 10 капель 6 раз в день.
- Раствор для инъекций: в острых случаях - ежедневно, в других случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутривожно, при необходимости - внутривенно.
- Капли в нос: впрыскивать по 1-2 дозы в каждую ноздрю 3-5 раз в день, для детей до 6 лет - по 1 дозе 3-4 раза в день. Можно использовать также и для детей до 1 года.

- Euphorbium compositum S (капли, раствор для инъекций) назначается при острых и хронических воспалениях придаточных пазух носа (гайморовой, лобной, решетчатой, клиновидной), при катаральном воспалении трубы уха и при водянке среднего уха.
- Капли для носа показаны при хроническом сухом катаральном рините, сухой слизистой оболочке носа в сочетании с хроническими воспалениями придаточных пазух; для облегчения носового дыхания при нервном и аллергическом насморке (сенном насморке), при остром рините и простудных катарах (способствует выделению секретов, облегчает носовое дыхание, снижает давление). Они также показаны как вспомогательное средство при зловонном насморке (озене).

- Экспериментальное применение данного препарата имело значительный терапевтический эффект, особенно при хронических воспалениях придаточных пазух носа (сухая форма, атрофия слизистой оболочки носа), так как он реактивировал слизистую оболочку и вызывал ее увлажнение (с точки зрения феномена регрессивной викариации). Одновременно рекомендуется назначать препарат *Mucosa compositum*, а при длительном применении лекарственных препаратов, в том числе мазей, - препараты *Coenzyme compositum* и *Ubichinon compositum*, способствующие активации ферментов. При воспалительных проявлениях дополнительно показаны *Echinacea compositum S*, *Traumeel S*, *Engystol N*.

- При афонии назначается Euphorbium compositum S в сочетании с Echinacea compositum S, Mucosa compositum и Ubichinon compositum.
- При водянке среднего уха и при хроническом отите рекомендуется применять одновременно все три формы выпуска препарата Euphorbium compositum S.

- Капли для носа оказывают специфическое воздействие на функции слизистой оболочки носа и на пазухи и в соответствии с этим применяются для терапии заболеваний слизистой оболочки придаточных пазух носа, при остром и аллергическом насморке. Препарат препятствует снятию опуханий слизистой оболочки, не вызывает реактивной гиперемии с последующими сужениями дыхательных путей и способствует, благодаря физиологическому раствору поваренной соли, рассасыванию корочек и продуктов секреции. Он предотвращает высыхание слизистой оболочки, обеспечивает свободное дыхание и снимает давление в области лба. Длительное применение препарата не снижает терапевтический эффект, а, наоборот, повышает его.