

КРАСНАЯ
КНИГА
КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

КРАСНАЯ КНИГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ-

официальный документ, содержащий аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Курганской области, сведения о их состоянии и распространении, а также необходимых мерах охраны. Учреждена Постановлением Администрации Курганской области № 614 от 5 ноября 1999 года «О Красной книге Курганской области» на основании Закона Курганской области № 162 от 2 октября 1998 года. Первое издание опубликовано в 2002 году.

В ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫШЕДШЕЕ В 2002 ГОДУ ВКЛЮЧЕНЫ


191 вид растений, 68 видов насекомых, 4 вида костных рыб (нельма, сазан, сибирский голец, сибирская щиповка), 6 — земноводных (сибирский углозуб, зелёная жаба, обыкновенная жаба, озёрная лягушка, сибирская лягушка, травяная лягушка), 1 — пресмыкающихся (обыкновенная медянка), 46 — птиц и 9 видов млекопитающих.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Второе издание вышло в свет в 2012 году.

В нем отражено современное состояние растительного и животного мира, принятые и перспективные меры охраны редких и исчезающих объектов растительного и животного мира.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ КРАСНОЙ КНИГИ



СТЕПНОЙ СУРОК, ИЛИ БАЙБАК

Степной сурок, или байбак

Отряд Rodentia – Грызуны
Семейство Sciuridae –
Беличьи



Байбак самый крупный представитель беличьих в Курганской области. Длина тела до 58 см, хвоста – 14,5 см. Весят крупные байбаки до 6 – 7 кг. Шерсть у степного сурка короткая и мягкая, окрашена в песчано-желтый цвет с черной или черно-бурой рябью.

Питается дикорастущими травами. Размножается на третий год, в помете 4 – 5 детенышей.

В Курганской области обитает в полынно-злаковой степи близ оз. Пьянково и оз. Потеряй.

Притобольская белка

Отряд Rodentia – Грызуны

Семейство Sciuridae –
Беличьи



Длина тела зауральских бурундуков, как правило, не превышает 150 мм. Хвост длиной, равной $3/4$ длины тела, покрыт волосами, расчесанными на обе стороны. Масса взрослых животных чуть более 100 г. По окраске меха бурундук выделяется среди всех наших грызунов яркой, пестрой расцветкой. Общий тон окраски бурундука – рыжевато-серый, переходящий на брюшке в слегка грязновато-белый цвет. Вдоль спины по всей ее длине проходят пять густо-черных полос.

Впадает в зимнюю спячку, которая заканчивается в конце марта – апреле. Зверек хорошо лазает по деревьям.

В Курганской области бурундук отлавливался в Шатровском и Каргапольском районах. Опросные данные свидетельствуют о наличии этого зверька в Шадринском и Далматовском районах.



Турпан

Отряд Anseriformes –

Пластинчатоклювые

Семейство Anatidae – Утиные

Крупная (размером с крякву), массивного телосложения нырковая утка с большой головой и короткой шеей. Хвост на воде держит опущенным. Прекрасно ныряет, с воды поднимается неохотно, с короткого разбега, и летит низко над ней. По суше ходит неуклюже. Очень осторожен.

По анкетным данным, в Курганской области его видели на пролете в Далматовском, Лебяжевском, Притобольном, Целинном, Юргамышском, Макушинском районах.



Зеленая жаба

Отряд Anura – Бесхвостые
земноводные

Семейство Bufonidae – Жабы

Зауральские экземпляры достигают размеров до 85 мм. Кожа спины бугристая. Верх сероватый или оливковый с зелеными пятнами и рыжеватыми точками. Брюхо сероватое или желтоватое с пятнами или без них. Имеется барабанная перепонка, у самцов – резонаторы.

В Курганской области известны находки из Звериноголовского, Притобольного, Юргамышского, Мишкинского, Шадринского и Щучанского районов. Наиболее северный пункт ее нахождения – село Мальцево Шадринского района.

В Курганской области обитает на озерах, болотах, карьерах и лужах. Этот вид лучше других выносит сухость воздуха и часто вне периода размножения встречается на значительном удалении от водоемов.

Сибирский голец

Отряд Cypriniformes – Карпообразные
Семейство Cyprinidae Bonaparte, 1832 –
Карповые



Окраска тела бурая с пятнами, меняется в зависимости от донного субстрата. Хвостовой плавник слегка выямчатый или усеченный. Чешуя мелкая, малозаметная и располагается без налегания друг на друга. Голова сплюснута в спинно – брюшном направлении. Четыре усика расположены на конце рыла и два – в углах рта. Рот нижний с хорошо развитыми губами. Длина тела 8 – 12 см

Рыба активна в сумеречное и ночное время. Питание разнообразное (зоопланктон, зообентос, икра и мальки других рыб).

В Курганской области голец был зарегистрирован на реках Суерь, Утяк, Миасс и небольших притоках реки Исеть. На р. Миасс наличие сибирского гольца предположительно.

Венерин башмачок настоящий

Редкий вид.

Многолетнее травянистое летнезеленое длиннокорневищное растение.

В Курганской области встречается близ сел Березово, Карандашево, Кушма Шумихинского района, с. Узково, Каминское Куртамышского района, между Темляковым и Нагорским в Притоболье, близ с. Рынки и на лесных полуостровах оз. Медвежье в Петуховском районе.



Нарушение популяций в результате сбора цветущих растений на букеты и выкапывания корневищ для переноса в культуру.

Кокушник комариный

Редкий вид.

Многолетнее травянистое летнезеленое клубневое растение.

Встречается в Курганской области – с. Березово Шумихинского района, с. Введенское, с. Ст. Просвет, г. Курган, между селами Дубровное и Могильное Мишкинского района, с. Шастово.



Вид внесен в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС.

Солодка Коржинского

Редкий вид.

Многолетнее травянистое
летнезеленое
длиннокорневищное растение.
Популярное лекарственное
растение: в местах
произрастания корневища
нередко в массе заготавливаются
населением.

Распространён в Курганской области:
близ с. Березово Шумихинского района, у
пос. Мишкино, близ г. Кургана,
пос. Варгаши, г. Петухово.

**Запрет на неконтролируемый сбор в качестве
растительного сырья, особенно в коммерческих целях.
Вид Красной книги РСФСР .**



Золототысячник Мейера

Редкий вид.

Однолетнее стержнекорневое растение.

Местонахождение на западе Курганской области: близ с. Узково Куртамышского района, по берегу оз. Горькое у с. Тихоновка Щучанского района, южнее пос. Мишкино, близ сел Шаламово и Мокрушино Мишкинского района

Исчезает при вытаптывании грунта на пастбищах и в условиях длительного подтопления солонцовых лугов.





Любите родную природу –
Озера, леса и поля.
Ведь это же наша с тобою
Навеки родная Земля.

На ней мы с тобой родились,
Живем мы с тобою на ней.
Так будем же, люди все вместе
Мы к ней относиться добрей!





ЗАДУМАЙТЕСЬ

КРАСНАЯ КНИГА