



Тема:

**Проблемы женщин,
злоупотребляющих вредными
привычками во время
беременности и после.**


Рассматриваемые проблемы

- ▣ **Курение во время беременности.**
 - ▣ **Употребление спиртных напитков во время беременности.**
 - ▣ **Употребление наркотиков во время беременности.**
- 

Употребление спиртных напитков во время беременности: влияние на генетический аппарат.

- ▣ В подавляющем большинстве случаев женщин, принимающих наркотики, ждут осложнения во время беременности.**
 - ▣ Точно установлено, что ряд наркотиков оказывают очень вредное воздействие на плод.**
- 

Цели

- ▣ **Показать важность данной проблемы.**
 - ▣ **Показать влияние вредных привычек на здоровье будущего ребенка.**
 - ▣ **Предостеречь о последствиях.**
- 


Курение во время беременности

- ▣ Влияние на плод.
- ▣ Спонтанные аборт.
- ▣ Мертворожденные.
- ▣ Недоношенные дети.
- ▣ Физическое и интеллектуальное развитие.
- ▣ Перинатальная смертность.
- ▣ Здоровье ребенка.
- ▣ Результаты курения при беременности.

Это важно знать

- ▣ **Доказано, что вдыхание табачного дыма независимо от содержания никотина приводит к выраженной гипоксии плода, обусловленной оксидом углерода, который свободно через плаценту матери проникает в кровь плода.**

Это важно знать

- ▣ **Риск спонтанного аборта у женщин, курящих во время беременности, оказывается на 30-70% выше, чем у некурящих.**
 - ▣ **Уровень смертности детей при родах у курящих матерей в среднем на 30% выше, чем у некурящих.**
- 


Это важно знать

- ▣ У курящих женщин выкидыши бывают в 22,5-41% случаев, у некурящих — всего в 7,4%.
Риск развития симптома внезапной смерти новорожденного у курящих повышен на 52%.

Это важно знать

- ▣ У курящих женщин выкидыши бывают в 22,5-41% случаев, у некурящих — всего в 7,4%. Риск развития симптома внезапной смерти новорожденного у курящих повышен на 52%.
- ▣ Выкуривание женщиной даже 4 сигарет в день представляет серьезную опасность для возникновения преждевременных родов, которая удваивается при выкуривании 5-10 сигарет в день.

Это важно знать

- ▣ Дети, родившиеся у курящих женщин, характеризуются замедлением не только физического, но и интеллектуального, в том числе эмоционального развития.
 - ▣ Уровень смертности детей при родах у курящих матерей в среднем на **30%** выше, чем у некурящих.
- 


Результаты курения во время беременности

- ▣ **увеличение частоты самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов;**
 - ▣ **рост частоты недоношенности и недостаточность массы тела при рождении;**
 - ▣ **нарушения в кормлении новорожденных;**
 - ▣ **снижение адаптационных возможностей и риск заболеваний новорожденных;**
 - ▣ **увеличение числа врожденных дефектов развития;**
 - ▣ **ухудшение физического и психического развития ребенка.**
- 

Употребление алкоголя во время беременности

- ▣ **Детородная функция у женщин, злоупотребляющих алкоголем, существенно нарушается, у них чаще наблюдаются токсикозы беременных, мертворождения, преждевременные роды, у новорожденных чаще отмечаются параличи.**
- ▣ **Патология беременности при злоупотреблении алкоголем была выявлена в 46,5%, а патология родов — в 53,5% случаев.**


Употребление наркотиков во время беременности: Влияние на генетический аппарат.

- ▣ В подавляющем большинстве случаев женщин, принимающих наркотики, ждут осложнения во время беременности.
 - ▣ Точно установлено, что ряд наркотиков оказывают очень вредное воздействие на плод.
- 

Влияние на генетический аппарат


- ▣ При обследовании 174 больных хроническим алкоголизмом обнаружили биологическую неполноценность яйцеклеток, у 26 родившихся у них детей имелись врожденные уродства лица.

Женщина, употребляющая алкоголь до и во время беременности должна **ПОМНИТЬ, ЧТО**

- ▣ Умеренное употребление алкоголя во время беременности повышает вероятность выкидыша, а чрезмерное — часто ведет к аномалиям у плода. Хроническое пьянство во время беременности может привести к аномалии развития плода, называемой **плодным алкогольным синдромом**.
- 

Осложнения вызванные приемом наркотиков.

- ▣ резко возрастает риск рождения мертвого плода, выкидыша, происходит понижение веса новорожденного, задержка умственного развития, преждевременные роды, а также, может развиться синдром внезапной смерти ребенка.

- ▣ **Если алкоголь попадает в кровь плода, то в первую очередь поражаются печень, сосудистая система, а также те структуры мозга, которые определяют умственную деятельность.**
 - ▣ **У женщины при употреблении алкоголя повреждаются яйцеклетки, каждая из которых несет генетическую информацию о вашем будущем ребенке. Так что алкоголь опасен даже до беременности.**
- 

Осложнения вызванные приемом наркотиков.

- ▣ **Некоторые наркотики (опий и кокаин), принося не только непосредственный вред в развитие ребенка, но и косвенный, они приводят к сужению кровеносных сосудов плаценты, тем самым ограничивая снабжение плода кислородом (подобно никотину, вызывают кислородное голодание плода).**

Осложнения вызванные приемом наркотиков.

- ▣ **Интоксикация кокаином может вызвать судороги, аритмию, гипертонию и повышенную температуру у матери, а продолжительное употребление кокаина — нарушения циркуляции питательных веществ и температурного режима, что губительно скажется на ребенке. Кокаин может стать причиной выкидыша, преждевременного отделения плаценты и врожденных пороков у ребенка.**