

КОЛЛАПС



КОЛЛАПС

Острая сосудистая недостаточность, при которой значительно уменьшается масса крови, циркулирующей в организме, и падает общий сосудистый тонус.

Коллапс сердца зачастую способен привести к смертельному исходу, поэтому так важно оказать первую медицинскую помощь.



ПРИЧИНЫ:

- 1. Большая потеря крови, которая может быть следствием разрыва какого-нибудь внутреннего органа или серьёзными наружными травмами тела.
- 2. Резкое изменение положения тела у лежащего больного.
- 3. Пубертальный период у девочек.
- 4. Различные перенесённые инфекционные заболевания (например, сыпной тиф, дизентерия, сибирская язва, токсический грипп, вирусный гепатит или пневмония).
- 5. Интоксикация организма (например, передозировка различных лекарств или пищевое отравление).
- 6. Нарушения ритма сердца: инфаркт миокарда, тромбоэмболия лёгочных артерий, миокардит, гемоперикард.
- 7. Обезвоживание организма.
- 8. Сильный удар электрическим током.
- 9. Высокая температура окружающей среды: тепловой удар, например.
- 10. Сильные дозы ионизирующего излучения.

ПРИЗНАКИ:

- 1. Самочувствие ухудшается очень внезапно.
- 2. Резкая головная боль.
- 3. Потемнение в глазах – зрачки больного расширяются, шум в ушах.
- 4. Неприятные ощущения в области сердца.
- 5. Слабость.
- 6. Резкое снижение артериального давления.
- 7. Кожные покровы моментально бледнеют, холоднеют и становятся влажными, а затем наблюдается цианоз (посинение кожных покровов).
- 8. Черты лица резко заостряются.
- 9. Нарушение дыхательного ритма: дыхание становится частым и поверхностным.
- 10. Пульс прощупать практически невозможно.
- 11. Низкая температура тела.
- 12. Возможна потеря сознания.
- 13. Больной покрывается липким потом.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

- 1. Расположите больного следующим образом:
 - он должен лежать в горизонтальном положении на спине,
 - поверхность, на которой он лежит, должна быть жёсткая и ровная;
 - голова должна быть слегка согнута,
 - ноги должны быть слегка приподняты – так вы обеспечите приток крови к головному мозгу.
- 2. Избавьте больного от узкой, стесняющей одежды – расстегните все манжеты, пуговицы, воротник, ремень.
- 3. Вызовите как можно скорее скорую помощь.
- 4. Обеспечьте больному приток свежего воздуха через открытое окно или балкон.
- 5. Согрейте больного, обложив его со всех сторон горячими грелками.
- 6. Дайте больному понюхать нашатырный спирт.
- 7. Если коллапс вызван большой кровопотерей, нужно как можно быстрее остановить кровотечение.
- 8. Обеспечьте больному полный покой.



