

5 ДЕРЕВЬЕВ ИЗ НАШЕГО ПАРКА



Содержание:

1. [Берёза](#)
2. [Дуб](#)
3. [Ранетка \(дикая яблоня\)](#)
4. [Акация](#)
5. [Рябина](#)

(В презентации работают гиперссылки)

БЕРЁЗА



- Берёза — род листопадных деревьев. Берёза хорошо распространена в Северном полушарии. На территории России принадлежит к числу наиболее распространённых пород.
- Берёза занимает важное место в культуре славян, скандинавов, финно-угорских и других народов.
- Большинство видов берёз — деревья высотой до 30 — 45м, с обхватом ствола до 12-150 см.
- Продолжительность жизни берёзы, по разным меркам, - 100-120лет, 150(300) лет, отдельные деревья доживают до 400 лет и более.



Высушенные листья берёзы

- Многие части берёзы используют в хозяйстве: древесина, береста (поверхностный слой коры), берёзовый сок.
- Почки и листья применяют в медицине: настои из почек и листьев — как мочегонное, бактерицидное, ранозаживляющее и жаропонижающее средства.
- А масляную вытяжку из берёзовых почек — как дерматологическое средство.
- Некоторые виды используют для создания полезацидных полос, а так же в декоративном садоводстве.

Дуб



Дуб — род деревьев и кустарников семейства буковые. Естественным ареалом дуба являются регионы

Северного полушария с умеренным климатом.

В России значительно распространён только один вид — Дуб черешчатый.



Высушенные листья дуба

Дуб пробковый — применяется для создания пробок для бутылок.

Дуб каменный — используется в пищу американскими индейцами.

Желудями корят скот. А ещё существует желудёвое кофе, которое варят из желудей. Жёлуди из которых можно варить кофе, произрастают только в России.

Дубы часто используют для озеленения городов.

Ранетка (дикая яблоня)



“Ранетка” — это общее название для нескольких мелкоплодных яблонь, которые появились при скрещивании сибирской ягодной яблони и европейских сортов. Сорту яблони получил большое количество характеристик от сибирской ягодной (“сибирки”). Деревья адаптируются к большинству климатических условий, при этом есть отдельные виды “ранеток”, которые районированы для Урала, Алтая и Дальнего Востока.




Высушенные листья ранетки

Описание места посадки яблонь “ранеток” мало чем отличается от выбора места для посадки любой яблони. Желательно, чтобы грунтовые воды залегали не слишком близко к поверхности земли, сам участок хорошо освещался и был не слишком ветреным.



Греческое слово *Асасіа* означает «колючка». И неудивительно, поскольку большинство видов этого растения вооружено множеством острых шипов в качестве защиты от любителей полакомиться листьями. Чаще всего акации – это вечнозеленые деревья или кустарники высотой от 1,5 до 25 м и внушительным диаметром ствола, достигающим 1,2 м. Они очень быстро растут, но к 30 годам уже стареют, изреживают крону и приобретают объемистые дупла....



В Средней Азии и Монголии растет интересная акация верблюжий хвост – на самом деле она называется карагана гривастая (*Caragana jubata*), или чапыжник гривастый. Растение выглядит как бурый, слегка изогнутый столбик с пучком зелени и ободком белых цветков на макушке. Сходны с нашей героиней и виды рода Гледичия (*Gleditsia*) – роскошные долговечные деревья с мощными красными колючками и бобами длиной до 40 см....

Высушенные листья акации

Рябина



Рябина — род относительно невысоких древесных растений обыкновенная, вследствие большой её распространённости и невысокого качества её плодов, принадлежит к числу малоценных плодовых Деревьев. Рябина часто разводится как декоративное дерево; плоды её идут в пищу, а тяжёлая, упругая, прочная древесина — для столярных изделий. Рябина имеет значение и как медонос.



Высушенные листья рябины

Плоды рябины потребляются в свежем виде, в виде варенья, джемов, киселей, настоек, пастилы, мармелада, желе, а также мочёная и маринованная. Рябиновый сок используется в ликёро-водочном производстве. Порошок, приготовленный из сушёных плодов, идёт на начинку для пирогов. Плоды рябины использовались в народной медицине; в научной медицине рябина не используется.

**Изучайте окружающий мир.
И спасибо за внимание!**

