

Ойы

Н

10

20

30

40

10

20

30

40

1
0

2
0

3
0

4
0



10

*Қоздырғыштың
орналасуы*

*ауыз қуысы,
жұтқыншақта,
тыныс алу жолдары.
Қоздырғышың таралуы - жотелу,
түшкіру, әңгімелесу кезінде*



20

ЖРВИ анықтамасы

**Жедел респираторлы
вирусты инфекция (ЖРВИ)–**
әр түрлі жастағы адамдарда
кездесетін, интоксикация
дәрежесіне және тыныс алу
жолдарының зақымдану
деңгейіне байланысты
клиникалық көріністері, түрлері
түрлі ауырлықта өтетін кең
таралған ауру.

30

Тұмау анықтамасы

*интоксикация және жоғарғы
тыныс жолдарының шырышты
қабатының зақымдануымен,
әсіресе айқын трахеитпен
көрінетін жедел вирусты
инфекция.*



40

*Клиникалық ағымының
түрлері*

Симптомсыз
Жеңіл
Орташа ауырлықта
Ауыр
Өте ауыр



10

*Инфекцияның таралу
көздері:*

- *Әртүрлі клиникалық формалары бар ауру адам (7-10 күннің ішінде), аденовирус инфекциясы кезінде - 25 күн және одан көп;*
- *вирус тасушылар (аденовирусты инфекция).*

20

Берілу жолдары:

*Ауа-тамшы;
Тұрмыстық-қатынас
Алиментарлы
(аденовирусты
инфекция кезінде)*



30

Грипптің клиникасы

Грипптің клиникалық жіктелуі

- Типті
- Атипті
 - Атиптік түрі :**
 - Жеңіл
 - - акатаральды
 - - афебрильды
 - Ауыр
 - - «найзағай» тәріздес
 - - геморрагиялық
- Ағымы бойынша**
- жеңіл
- орташа ауыр
- ауыр.

40

***Тұмау және басқа ЖРА-
дың клиникалық
жіктелуі:***

Этиологиясы бойынша:

А типті тұмау

В типті тұмау

С типті тұмау

Паратұмау инфекциясы

Аденовирусты инфекция

Респираторлы-синцитиальды инфекция

Риновирусты инфекция

Коронавирусты инфекция

Микоплазмалы инфекция

Бактериальды этиологиялы ЖРА

Аралас этиологиялы ЖРВИ

10

Грипптің типтік түріне
қандай 2 синдром тән

***Клиникасына 2 синдром тән
Интоксикация синдромы.
Катаральды синдром.***

***Аурудың ауырлық дәрежесін
анықтайтын негізгі синдром –
интоксикация синдромы.***

20

***Тұмауға қарсы 5
қадам***

Бірінші қадам: Жеке бас тазалығын сақтау !

Киімнің, төсек орын тазалығын қадағалау қажет. Бөлмені үнемі желдетіп, тазалау керек.

Екінші қадам :Салауатты өмір салты!

Үнемі қозғалыста болып, зиянды әдеттерден абас тартып, демалыс пен жұмыс уақытын дұрыс жоспарлау қажет.

Үшінші қадам :Иммунитетті жоғарылату!

Спортпен, дене шынықтырумен жиі айналысу. күнделікті рационға витаминдерге, минералды заттарға, аминқышқылдарға бай тағамдар енуі қажет.

Төртінші қадам :Алдын алу шараларын жүргізу!

Эпидемия қаупі туған кезде арнайы дәрілік заттармен алдын алып немесе вакцина жасау керек.

Бесінші қадам: Абайлаңыздар-тұмау!

Өзіңізді нашар сезінсеңіз дәрігерге қаралыңыз. басқа адамдармен қатынасқа түспеңіз. егер туысқандарыңыз бен таныстарыңыз ЖРВИ-мен ауырған жағдайда маска тағып жүріңіз.

30

ЖРВИ емдеу

- ЖРВИ науқастарына ем амбулаторлы және стационар жағдайында да жүргізіледі.
- Науқастарды госпитализациялау клиникалық белгілері бар ЖРВИ-ң барлық түрлерінде, грипп кезінде –эпидемиялық көрсеткіштер бойынша жүргізіледі.
- Нозологиялық, клиникалық, ауырлық дәрежелерін ескере отырып келесі комплексті ем тағайындалады
- Тәртіп, диета.
- Патогендік дезинтоксикациялық дәрілер.
- Вирусқа қарсы дәрілер-ремантадин, арбидол, реленза, томифлю, лейкоцитарлы интерферон, лейкоинтерферон немесе интерферон индукторлары-циклоферон, амиксин, изопринозин.
- Симптомды ем: фервекс, колдакт, колдрекс.

40

Алдын-алу шаралары:

- Денені шынықтыру
- Грипп кезінде ең тиімдісі вакцинация-қыркүйек-қазан айлары, барлық тұрғындардың 70 пайызын қамту керек.
Келесі инактивирленген грипп вакциналары қолданылады

Гриппан (Россия) б/е;
Флюарикс (Бельгия) б/е;
Инфлювак (Нидерланды) б/е;
Бегрубак (Германия) б/е;
Заксикгрипп (Франция) б/е т.б.

НАЗАРЛАРЫҢЫ

ЗҒА

РАХМЕТ!!!